

Bolboschoenus glaucus (Kamyšník jižní)

synonyma: B. var. macrostachys, Bolboschoenus macrostachys, Bolboschoenus maritimus subsp. macrostachys, Bolboschoenus maritimus var. macrostachys, Scirpus glaucus, Scirpus macrostachys, Scirpus maritimus f. macrostachys, Scirpus maritimus var. glaucus, Scirpus maritimus var. macrostachys

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Idaho, Indie, Itálie, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, New Jersey, New York, Oregon, Pákistán, Senegal, Středozeemí, Z Asie

Pochází z Afriky, středozeemí, západní a střední Asie až po Indii a zavlečen byl do Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek zakončený hlízami průměru 7mm. Stonek má v průměru 1 - 1,5cm a v průřezu je 3úhlý. Listy mají min. stejnou délku jako stonek, do 25cm, šířku 1 - 2,5mm. Květenství je bohaté tvořené 16 - 40ti i více stopkatými nebo přisedlými klásky délky 0,6 - 1,2cm, šířky 4 - 6mm. Plody mají na hřbetu drobnou hranu a na řezu jsou tupě 3hranné až bochničkovité.

Potřebuje teplo.

<https://www.rostliny.net/>