

Adenophora liliifolia (Zvonovec liliolistý)

synonyma: *Adenophora alpini*, *Adenophora communis*, *Adenophora communis* var. *integerrima*, *Adenophora cordata*, *Adenophora fischeri*, *Adenophora intermedia*, *Adenophora liliifolia*, *A. f. alba*, *A. f. infundibuliformis*, *A. f. stylosa*, *A. f. villosula*, *A. var. alba*, *A. var. angustata*, *A. var. infundibuliformis*, *A. var. integerrima*, *A. var. pocsii*, *A. var. spreta*, *A. var. stylosa*, *A. var. suaveolens*, *Adenophora marsupiflora* var. *pilosa*, *Adenophora mikoi*, *Adenophora periplocifolia*, *Adenophora perpallens*, *Adenophora polymorpha*, *Adenophora polymorpha* f. *integrisepala*, *Adenophora polymorpha* f. *raddeana*, *Adenophora polymorpha* var. *integerrima*, *Adenophora rhomboidea*, *Adenophora setulosa*, *Adenophora stylosa*, *Adenophora suaveolens*, *Adenophora suaveolens* var. *latifolia*, *Campanula alpini*, *Campanula alpini* var. *asperula*, *Campanula alpini* var. *botryantha*, *Campanula alpini* var. *hirtula*, *Campanula alpini* var. *hungarica*, *Campanula alpini* var. *polyadenia*, *Campanula alpini* var. *setulosa*, *Campanula alpini* var. *villosula*, *Campanula cordata*, *Campanula fischeri*, *Campanula intermedia*, *Campanula liliflora*, *Campanula liliifolia*, *Campanula liliifolia* var. *hirta*, *Campanula liliifolia* var. *polyadenia*, *Campanula liliifolia* var. *setulosa*, *Campanula mikoi*, *Campanula periplocifolia*, *Campanula perpallens*, *Campanula rhomboidea*, *Campanula spreta*, *Campanula stylosa*, *Campanula suaveolens*, *Campanula subuniflora*, *Campanula umbrosa*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Alpy, Altaj, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Itálie, J Ural, Karpaty, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, S Čína, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, Z Rusko

Roste ve střední a východní Evropě a západní Asii po Altaj v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 1)m. Pod zemí vytváří vřetenovitý až řepovitý kořen. Vytváří přízemní růžici a 1 - 15 podélně rýhovaných řídce ochlupených lodyh o délce 40 - 90cm. Přízemní listy jsou srdčité až kulaté, hrubě pilovité, dlouze řapíkaté, záhy zasychají, lodyžní listy jsou střídavé, pilovité až prakticky celokrajné, lesklé, při zemi řapíkaté, obvejčité až eliptické, výše položené jsou přisedlé, eliptické až kopinaté a na bázi klínovité. Květenstvím je bohatá lata (i hrozen) s až 12ti větvemi, vlastní květy jsou převislé, tence stopkaté, 5tičetné, vonné, kališní cípy jsou úzce 3úhlé, špičaté, jemně pilovité, koruna je zvonkovitá, dlouhá i široká 1,2 - 2cm a světlemodrá (i bílá). Plodem je hruškovitá tobolka délky 0,8 - 1,2cm a obsahuje rezavohnědá lesklá zploštělá podélně svrasklá semena. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu světlé lesy, křoviny, louky, se silikátovým nebo vápenitým podkladem.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>