

Apera (Chundelka)

synonyma: Anemagrostis

čeleď: Poaceae

Pochází z Evropy a západní Asie, ale byla zavlečena i jinam. Patří mezi jednoletky a roste v trsech. Dorůstá výšky 1 - 1,2m. Listy jsou ploché, široé 0,1 - 1cm. Kvete v latě tvořené z malých zploštělých klásků obvykle z 1 (zřídka 2 - 3) květů. Plodem je obilka.

Apera baytopiana

Apera intermedia

synonyma: A. spica-venti subsp. intermedia

oblasti: Írán

Apera interrupta (Chundelka přetrhovaná)

synonyma: Agrestis interrupta, Agrostis anemagrostis subsp. interrupta, Agrostis interrupta, Agrostis spica-venti subsp. interrupta, Agrostis spica-venti var. interrupta, Aira spica-venti var. interrupta, Anemagrostis interrupta, A. spica-venti var. interrupta, Cynosurus splendens, Milium interruptum, Muhlenbergia interrupta

oblasti: Andalusie, Arizona, Asie, Britská Kolumbie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Oregon, S Afrika, Slovensko, Švýcarsko, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Dorůstá výšky (1,5 -) 20 - 40 (i 60)cm. Květenstvím je lata délky zpravidla do 10cm, za květu je hustá, široká do 2cm s větvemi délky max. 3cm, klásky mají délku 2 - 2,5mm a vlastní květy jsou zelené. U nás patří mezi vyhynulé druhy A1.

Vyhovují ji písečné přesypy a okraje lesů.

Apera spica-venti (Chundelka metlice)

synonyma: Agraulus anemagrostoides, Agrostis anemagrostis subsp. spica-venti, Agrostis anemagrostoides, Agrostis boetica, Agrostis filiformis, Agrostis purpurea, Agrostis rupestris var. filiformis, Agrostis spica-venti, Agrostis spica-venti f. flava, Agrostis spica-venti f. violacea, Agrostis spica-venti var. purpurea, Agrostis spica-venti var. pygmaea, Anemagrostis spica-venti, A. effusa, A. longiseta, A. maritima, A. purpurea, A. spica-venti f. flava, A. spica-venti f. prorepens, A. spica-venti f. purpurea, A. spica-venti f. violacea, A. spica-venti var. prorepens, A. spica-venti var. purpurea, Avena rupestris var. filiformis, Avena spica-venti, Festuca spica-venti, Milium spica-venti, Muhlenbergia spica-venti, Trichodium filiforme

oblasti: Asie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Německo, New York, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Texas, Vermont, Washington

Roste v Evropě (u nás na kladenských haldách) s mírným přesahem do Asie, zavlečená byla do Severní Ameriky a na Nový Zéland. Patří mezi jednoleté ozimy. Roste v trsech. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Stébla jsou vzpřímená, světlezelená se žlutým nádechem. Listy mají šířku 0,3 - 1cm, na spodní straně jsou nápadně žilkované, z obou stran jsou drsné, vyrůstají s hladkých pochev zakončených zdrsněním. Květenstvím je rozvětvená lata délky 20 - 30cm, za květu je řídká, široká 5 - 18cm s větvemi délky až 10cm, je složená z malých nafialovělých klásků délky 2,5 - 3mm. Semena mají délku 1,5 - 2,5mm a jsou zakončené 2 zuby.

Vyskytuje se na polích přenice a rýže na slunci nebo v polostínu v suché hlinité dobře propustné půdě.

Množí se semeny.

Apera triaristata

Další informace:

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/chundelka-metlice>

<http://botany.cz/cs/aper-a-spica-venti/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Chundelka>

<https://www.rostliny.net/>