

Apera spica-venti (Chundelka metlice)

synonyma: *Agraulus anemagrostoides*, *Agrostis anemagrostis* subsp. *spica-venti*, *Agrostis anemagrostoides*, *Agrostis boetica*, *Agrostis filiformis*, *Agrostis purpurea*, *Agrostis rupestris* var. *filiformis*, *Agrostis spica-venti*, *Agrostis spica-venti* f. *flavida*, *Agrostis spica-venti* f. *violacea*, *Agrostis spica-venti* var. *purpurea*, *Agrostis spica-venti* var. *pygmaea*, *Anemagrostis spica-venti*, *Apera effusa*, *Apera longiseta*, *Apera maritima*, *Apera purpurea*, *A. f. flavida*, *A. f. prorepens*, *A. f. purpurea*, *A. f. violacea*, *A. var. prorepens*, *A. var. purpurea*, *Avena rupestris* var. *filiformis*, *Avena spica-venti*, *Festuca spica-venti*, *Milium spica-venti*, *Muhlenbergia spica-venti*, *Trichodium filiforme*

čeleď: Poaceae

oblasti: Asie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Německo, New York, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Texas, Vermont, Washington

Roste v Evropě (u nás na kladenských haldách) s mírným přesahem do Asie, zavlečená byla do Severní Ameriky a na Nový Zéland. Patří mezi jednoleté ozimy. Roste v trsech. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Stébla jsou vzpřímená, světlezelená se žlutým nádechem. Listy mají šířku 0,3 - 1cm, na spodní straně jsou nápadně žilkované, z obou stran jsou drsné, vyrůstají s hladkých pochev zakončených zdrsněním. Květenstvím je rozvětvená lata délky 20 - 30cm, za květu je řídká, široká 5 - 18cm s větvemi délky až 10cm, je složená z malých nafialovělých klásků délky 2,5 - 3mm. Semena mají délku 1,5 - 2,5mm a jsou zakončené 2 zuby.

Vyskytuje se na polích přenice a rýže na slunci nebo v polostínu v suché hlinité dobře propustné půdě.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>