

Bartsia trixago (Belardie hřebenitá)

synonyma: Alectorolophus trixago, Bartsia bicolor, Bartsia capensis, Bartsia maxima, Bartsia rhinanthoides, Bartsia versicolor, Bellardia trixago, Euphrasia trixago, Euphrasia versicolor, Glossostylis abyssinica, Rhinanthus capensis, Rhinanthus maximus, Rhinanthus trixago, Rhinanthus versicolor, Trixago apula

čeleď: Orobanchaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Argentina, Austrálie, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Střední Čile, Sýrie, Texas, Tunisko, Turecko, Uruguay

Roste ve středozemí včetně Azorských a Kanárských ostrovů s přesahem do Íránu jako poloparazitická jednoletka, zavlečená byla do USA, Čile, Argentýny Uruguaye a Austrálie. Dorůstá výšky 10 - 60 (i 70)cm. Lodyha je přímá, větvená max. v horní části. Listy jsou vstřícené, přisedlé, úzce kopinaté, tupé, s tupě pilovým okrajem, dlouhé (1,4 -) 2 - 6 (i 9)cm a široké (0,2 -) 0,4 - 0,9 (i 1,2)cm. Kvete v hustém listenatém hroznu o délce (1,8 -) 2 - 10 (i 16)cm, vlastní květy mají kalich nafouklý, zvonkovitý, zploštělý, dlouhý (0,4 -) 0,8 - 0,9 (i 1)cm, má 4 3úhlé zuby, koruna 2pyská, dlouhá (1,1 -) 2 - 2,1 (i 2,5)cm, horní nebo dolní pysk růžový s dlouhým, druhý je bílý (občas oba bílé nebo žluté), horní je přilbovitý, zploštělý, dlouhý 1cm, dolní zploštělý, 3laločný, dlouhý 1,3cm a střední lalok má 2 podlouhlé výdutě. Plodem je vejčitá tobolka délky 0,6 - 1,2cm, šířky 4 - 6mm a obsahuje semena délky 0,6 - 0,7mm a šířky 0,4 - 0,5mm.

Vyhovují jí kamenité suché louky a pastviny.

<https://www.rostliny.net/>