

Chamaedaphne calyculata (Lýkoveček drobnokališný)

synonyma: Andromeda angustifolia, Andromeda calyculata, Andromeda calyculata var. anomala, Andromeda calyculata var. ventricosa, Andromeda crispa, Cassandra angustifolia, Cassandra angustifolia var. anomala, Cassandra calyculata, Cassandra calyculata var. angustifolia, Cassandra calyculata var. latifolia, Cassandra calyculata var. nana, C. var. angustifolia, C. var. latifolia, C. var. nana, Chamaedaphne crispa, Exolepta calyculata

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Finsko, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Labrador, Laponsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Rusko, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, SV Evropa, Tennessee, V Rusko, Vermont, Wisconsin, Yukon

Roste v chladnějších oblastech severní polokoule v podobě nízkého keře. Patří mezi stálezelené rostliny, ale často v zimě listí mění barvu na hnědočervenou. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Větve jsou metlovité. Listy jsou střídavé, eliptického až kopinatého tvaru délky 1 - 4 (i 5)cm, povrch je tuhý, kožovitý, spodní strana světlejší a okraje jsou nepravidelně zubaté. Květy jsou bílé, drobné, dlouhé 5 - 6mm, zvonkovitého tvaru, seskupené do lat o délce 4 - 12cm. Plodem je kulovitá tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Nana' - zakrslý

Vyhovují mu rašeliniště v polostínu.

Množí se vegetativně. Semena se vysévají do rašeliny. Možné je i řízkování v červnu a červenci nebo hřížení.

<https://www.rostliny.net/>