

Helictotrichon pubescens (Ovsíř pýřitý)

synonyma: *Arrhenatherum pubescens*, *Arrhenatherum pubescens* f. *alpinum*, *Avena alopecuros*, *Avena amethystina*, *Avena balloniana*, *Avena baumgartenii*, *Avena bornmuelleri*, *Avena carpatica*, *Avena glabra*, *Avena hirtifolia*, *Avena hugeninii*, *Avena insubrica*, *Avena laevigata*, *Avena laevigata* var. *insubrica*, *Avena lucida*, *Avena pseudolucida*, *Avena pubescens*, *Avena pubescens* f. *alpinum*, *Avena pubescens* f. *diantha*, *Avena pubescens* f. *latifolia*, *Avena pubescens* f. *stenophylla*, *Avena pubescens* subsp. *amethystina*, *Avena pubescens* subsp. *insubrica*, *Avena pubescens* var. *alpina*, *Avena pubescens* var. *amethystina*, *Avena pubescens* var. *glabra*, *Avena pubescens* var. *glabrescens*, *Avena pubescens* var. *hugeninii*, *Avena pubescens* var. *insubrica*, *Avena pubescens* var. *laevigata*, *Avena pubescens* var. *longifolia*, *Avena pubescens* var. *lucida*, *Avena varia*, *Avena versicolor*, *Avenastrum insubricum*, *Avenastrum laevigatum*, *Avenastrum pubescens*, *Avenastrum pubescens* var. *laevigatum*, *Avenastrum sesquiterium*, *Avenochloa laevigata*, *Avenochloa pubescens*, *Avenochloa pubescens* subsp. *anatolica*, *Avenochloa pubescens* var. *alpina*, *Avenula pubescens*, *Avenula pubescens* subsp. *bornmuelleri*, *Avenula pubescens* subsp. *laevigata*, *Avenula pubescens* subsp. *longiflora*, *Avenula pubescens* var. *amethystina*, *Avenula pubescens* var. *longiflora*, *Avenula pubescens* var. *longifolia*, *Festuca cristata*, *Helictotrichon anatolicum*, *Helictotrichon laevigatum*, *Helictotrichon pratense* f. *alpinum*, *Helictotrichon pubescens*, *H. f. batavicum*, *H. f. dianthum*, *H. f. latifolium*, *H. f. pallidum*, *H. f. stenophyllum*, *H. f. subracemosum*, *H. f. subtricolor*, *H. subsp. amethystinum*, *H. subsp. anatolicum*, *H. subsp. laevigatum*, *H. subsp. longifolia*, *H. var. alpinum*, *H. var. latifolium*, *Heuffelia laevigata*, *Heuffelia lucida*, *Heuffelia pubescens*, *Heuffelia pubescens* var. *pallida*, *Heuffelia pubescens* var. *subracemosa*, *Heuffelia pubescens* var. *subtricolor*, *Homalotrichon pubescens*, *Homalotrichon pubescens* subsp. *laevigatum*, *Trisetaria bornmuelleri*, *Trisetaria carpatica*, *Trisetaria sesquiteria*, *Trisetum alopecuros*, *Trisetum bornmuelleri*, *Trisetum carpaticum*, *Trisetum pubescens*, *Trisetum sesquiterium*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Arménie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Írán, Irsko, Island, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Manitoba, New Jersey, Ontario, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Švýcarsko, Ťan-šan, Vermont, Wisconsin

Roste v s výjimkou jihu v celé Evropě a v teplejších částech Asie jako trvalka v řídkých trsech, byl také zavlečen do Severní Ameriky a na Nový Zéland. Dorůstá výšky 0,3 - 1,1m. Stébla jsou vystoupavá, rozdělená na několik částí kolénky. Lodyžní listy jsou široké 2 - 6mm, přízemní listy jsou spolu s pochvou hustě ochlupené. Květenství může být převislé a dosahuje délky 8 - 15cm, tvoří jej 1 - 1,6cm klásky se 2 - 3mi osinami, které jsou na bázi válcovité, později zakroucené, pluška je na hřbetě holá a hladká a žilky nedosahují horního okraje pluchy. Plodem je obilka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *laevigata*
- subsp. *pubescens*

Vyhovují mu suché i vlhké louky, křoviny, pastviny, atp.

<https://www.rostliny.net/>