

Erigeron poncinsii

synonyma: *Aster poncinsii*, *Conyza andryaloides*, *Diplopappus andryaloides*, *Erigeron minjanensis*, *Erigeron paghmanicus*, *Erigeron primuloides*, *Psychrogeton andryaloides*, *Psychrogeton poncinsii*, *Psychrogeton primuloides*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Himáčalpradéš, Írán, Kašmír, Tádžikistán, Uttarpradéš, Xizang (Tibet)

Roste od Afganistánu přes Indii a Tádžikistán po Tibet v trsech. Dorůstá výšky 3 - 19cm. Pod zemí vytváří silný dřevitý oddenek. Lodyhy mají délku 4 - 8cm, jsou ochlupené (i žláznaté). Přízemní listy jsou obkopynaté až kopistěovité, celokrajné, zvlňené nebo hrubě zubaté, špičaté nebo tupé, dlouhé 2,5 - 6cm, řapíkaté a lodyžní listy jsou drobné, čárkovité a někdy chybí. Květenstvím je samostatný úbor průměru do 2cm, zákrovy jsou široce válcovité, zákrovní listeny ve 2 - 3 řadách, čárkovité, ochlupené, dlouhé do 8mm a liguly jazykovitých květy jsou bělavé až žluté, dlouhé do 4mm. Plodem je nažka s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *denudatus* - severní Indie; žláznatý povrch
- var. *poncinsii* - Tibet, severní Indie, Afganistán; žluté ligule

Vyhovují mu horské kamenité svahy a sutě.

<https://www.rostliny.net/>