

Echinochloa crus-galli (Ježatka kuří noha)

synonyma: *Digitaria hispidula*, *Echinochloa caudata*, *Echinochloa commutata*, *Echinochloa crus-corvi*, *E. f. aristata*, *E. f. atra*, *E. f. breviseta*, *E. f. echinata*, *E. f. exigua*, *E. f. longiseta*, *E. f. mitis*, *E. f. mixta*, *E. f. mutica*, *E. f. purpurea*, *E. f. rohlenae*, *E. f. submutica*, *E. f. vittata*, *E. f. zelayensis*, *E. subsp. zelayensis*, *E. var. aristata*, *E. var. austrojaponensis*, *E. var. breviseta*, *E. var. caudata*, *E. var. echinata*, *E. var. formosensis*, *E. var. kasaharae*, *E. var. longiseta*, *E. var. mitis*, *E. var. mutica*, *E. var. praticola*, *E. var. submutica*, *E. var. zelayensis*, *Echinochloa crus-pavonis* var. *austrojaponensis*, *Echinochloa crus-pavonis* var. *breviseta*, *Echinochloa crus-pavonis* var. *practicola*, *Echinochloa crusgalli* subsp. *submutica*, *Echinochloa dubia*, *Echinochloa echinata*, *Echinochloa formosensis*, *Echinochloa glabrescens*, *Echinochloa glabrescens* var. *glabra*, *Echinochloa glabrescens* var. *pilosa*, *Echinochloa hispida*, *Echinochloa macrocarpa* var. *aristata*, *Echinochloa macrocarpa* var. *mutica*, *Echinochloa macrocorvi*, *Echinochloa madagascariensis*, *Echinochloa micans*, *Echinochloa muricata* var. *occidentalis*, *Echinochloa occidentalis*, *Echinochloa paracorvi*, *Echinochloa persistentia*, *Echinochloa pungens* var. *occidentalis*, *Echinochloa spiralis*, *Echinochloa zelayensis*, *Milium crus-galli*, *Oplismenus crus-galli*, *Oplismenus crus-galli* var. *muticus*, *Oplismenus dubius*, *Oplismenus echinatus*, *Oplismenus limosus*, *Oplismenus zelayensis*, *Orthopogon crus-gallii*, *Orthopogon echinatus*, *Panicum crus-galli*, *Panicum crus-galli* f. *atra*, *Panicum crus-galli* f. *exiguum*, *Panicum crus-galli* f. *hispidum*, *Panicum crus-galli* f. *mixtum*, *Panicum crus-galli* f. *rohlenae*, *Panicum crus-galli* var. *angustifolium*, *Panicum crus-galli* var. *aristatum*, *Panicum crus-galli* var. *brevisetum*, *Panicum crus-galli* var. *echinatum*, *Panicum crus-galli* var. *longisetum*, *Panicum crus-galli* var. *mite*, *Panicum crus-galli* var. *muticum*, *Panicum crus-galli* var. *prostratum*, *Panicum crus-galli* var. *pumilum*, *Panicum crus-galli* var. *purpureum*, *Panicum crus-galli* var. *pygmaeum*, *Panicum crus-galli* var. *rohlenae*, *Panicum crus-galli* var. *submuticum*, *Panicum crus-galli* var. *zelayense*, *Panicum cruscorvi*, *Panicum crusgalli* var. *submuticum*, *Panicum echinatum*, *Panicum goiranii*, *Panicum hispidum*, *Panicum limosum*, *Panicum scindens*, *Panicum zelayense*, *Pennisetum crus-galli*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázad Kašmír, Ázerbájdžán, Baleáry, Balúčistán, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chajbar Paštúnchwá, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Georgia, Gilgit-Baltistán, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sindh, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v tropické Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,25 -) 0,3 - 1 (i 1,5)m v trsech. Stébla jsou hladká, přímá nebo vystoupavá a v kolénkách ochlupená. Listy jsou úzce čárkovité, dlouhé 7 - 35 (i 50)cm, široké (0,4 -) 1 - 2cm a pochva může být občas ochlupená. Květenstvím je vzpřímená nebo převislá lata délky (5 -) 8 - 20 (i 30)cm s větvemi délky do 5cm, klásky jsou zelené nebo naftalovělé, dlouhé 3 - 4mm a pleva je osinatá. Jediná rostlina dokáže vyprodukovať až 40tis. semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *angustifolia*
- subsp. *crus-galli* (Ježatka kuří noha pravá)

- subsp. oryzoides
- subsp. sieberiana
- var. submutica
- f. viridissima

Vyhovuje jí min. průměrná roční teplota 14 - 16°C. Na půdu nemá specifické nároky. Roste na polích, zahradách, vinicích, okrajích vod.

<https://www.rostliny.net/>