

Alstonia macrophylla

synonyma: *Alstonia acuminata*, *Alstonia batino*, *Alstonia brassii*, *Alstonia glabriflora*, *A. var. acuminata*, *A. var. glabra*, *A. var. mollis*, *Alstonia oblongifolia*, *Alstonia pangkorensis*, *Alstonia paucinervia*, *Alstonia subsessilis*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Florida, Havajské ostrovy, Indie, J Čína, Kambodža, Malajsie, Pákistán, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Vietnam

Roste v jižní Číně, Indonésii, Malajsii, Kambodži, Filipínách, Thajsku, Vietnamu, Sulawesi, Indonésii a Borneu v podobě stromu. Zavlečená byla do Indie, Srí Lanky, na Seychelské ostrovy a do tichomoří. Dorůstá výšky až 30m. Borka má světlešedou barvu. Kůra na kmeni i větvích obsahuje bílý latex. Listy vyrůstají v přeslenech po 3 (i 4)ks, jsou kožovité, na horní strana min. v mládí plstnaté, obvejčité, špičaté, dlouhé (7 -) 10 - 30 (i 50)cm, široké (4 -) 5 - 12 (i 15)cm, žilnatinu tvoří 15 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květy mají bílou barvu, průměr kolem 7mm, jsou seskupené do krátkých vrcholíků umístěných na koncích větví, kalich je zvonkovitý, 5tilaločný, laloky špičaté, dlouhé 0,5mm, koruna válcovitá, dlouhá 5mm, laloky jsou zakulacené a dlouhé 3mm. Plody jsou zelené, párovité, měchýřnaté, dlouhé 20 - 40 (i 45)cm, široké 3 - 5mm a obsahují mnoho ochlupených semen.

Růst je rychlý. Vyskytuje se v lesích a křovinách v nižší nadmořské výšce s vysokým úhrnem srážek.

<https://www.rostliny.net/>