

Alstonia scholaris

synonyma: Echites scholaris, Pala scholaris

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Afrika, Bangladéš, Filipíny, Guangxi, Indie, Indonésie, Kambodža, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Queensland, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v tropické Africe a Asii v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky (9 -) 18 - 26 (i 40)m. Borka je hnědošedá, vrásčitá. Listy vyrůstají v 3 - 10četných přeslenech, jsou tmavězelené, kožovité, lesklé, eliptické, zakulacené nebo krátce špičaté, dlouhé 7 - 20 (i 28)cm, široké 2 - 5 (i 11)cm, báze uťatá, spodní strana bělavá s nápadnou pravouhlou žilnatinou z 25 - 50ti žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 3cm. Květenství má délku až 12cm, vlastní květy jsou nálevkovité, bílé nebo béžové, trubka dlouhá 5 - 9mm, laloky kopinaté délky 1,5 - 4,3mm. Plodem je měchýřek délky 15 - 32 (i 60)cm, semena mají délku 4 - 5mm a jsou zakončená 1,5 - 2cm ochlupením.

<https://www.rostliny.net/>