

Alstonia spectabilis

synonyma: *Alstonia linearis*, *Alstonia longissima*, *Alstonia ophioxyloides*, *Alstonia somersetensis*, *A. subsp. ophioxyloides*, *Alstonia villosa*, *Alstonia villosa* f. *calvescens*, *Alstonia villosa* var. *glabra*, *Blaberopus villosa* var. *petiolata*, *Blaberopus villosus*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Malé Sundy, Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Pochází ze Západní Austrálie. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 - 25m. Vstřícné listy mají 1,5 - 2,5cm řapíky, čepel kopinatou, eliptickou nebo obvejčitou se špičkou, žilnatina má 18 - 20 žilek z každé strany, délka dosahuje až 36cm a šířka až 13cm. Květenství má délku až 11cm, vlastní květy jsou dlouhé 5 - 6mm, stopky délky 1,7 - 3mm, kališní lístky vejčité délky 1,5 - 2,2mm, koruna je béžová s 3,5 - 4,9mm trůbkou, laloky kopinatě vejčité délky 2,4 - 3mm. Plodem je 20 - 40cm měchýřek obsahující podlouhlá semena délky 5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ophioxyloides* - Západní a severní Austrálie; čepel kopinatá až eliptická, spodní strana sametová

- subsp. *spectabilis* - Queensland, Nová Guinea, Timor; čepel eliptická až obvejčitá, holá nebo řídce ochlupená

<https://www.rostliny.net/>