

Allium flavum (Česnek žlutý)

synonyma: *A. f. bulbiferum*, *A. subsp. adriaticum*, *A. subsp. valdensium*, *A. var. adriaticum*, *A. var. webbii*, *Allium montanum*, *Allium nitschmannii*, *Allium pallens*, *Allium paniculatum*, *Allium pulchellum* var. *pallens*, *Allium pulchellum* var. *valdensium*, *Allium ruthenicum*, *Allium valdense*, *Allium valdensium*, *Allium webbii*, *Cepa flava*, *Codonoprasum flavum*, *Codonoprasum flexum*, *Codonoprasum pallens*, *Kalabotis flavum*

čeleď: Alliaceae

oblasti: Altaj, Česká republika, Itálie, Kavkaz, Kazachstán, Řecko, Turecko

Roste v jižní Evropě s přesahem na jih střední Evropy, dále až po Kavkaz jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří eliptickou cibuli průměru 1 - 2cm s tmavou kožovitou slupkou. Lodyha s listy jsou sivozeleně ojněné. Listy jsou úzké, čárkovité a v počtu 2 - 3ks. Kvete žlutými až žlutozelenými květy v řídkém kulovitěm lichookolíku na nestejných stopkách složeném z asi 30ti ks květů, toulec je složený ze 2 zelených až 10cm dlouhých listenů, stopky květů jsou různě dlouhé a převislé (při tvorbě plodů se napřimují). Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *adriaticum*
- f. *bulbiferum*
- subsp. *flavum* (Česnek žlutý pravý)
- subsp. *lignosum*
- var. *pilosum*

Vyhovují mu suchá místa, křoviny, stepi a kamenité stráně na plném slunci s vápenitým podkladem.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>