

Allium neapolitanum (Česnek neapolský)

synonyma: *Allium album*, *Allium amblyopetalum*, *Allium candidissimum*, *Allium candidum*, *Allium cowanii*, *Allium euosmon*, *Allium gouanii*, *Allium inodorum*, *Allium lacteum*, *Allium laetum*, *Allium liliflorum*, *A. var. angustifolium*, *Allium sieberianum*, *Allium subhirsutum*, *Allium subhirsutum subsp. album*, *Allium subhirsutum var. glabrum*, *Allium sulcatum*, *Geboscon inodorum*, *Nothoscordum inodorum*

čeleď: Alliaceae

oblasti: Albánie, Andalusie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Louisiana, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie

Roste v jižní Evropě, Malé Asii a severní Africe jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 50 (i 70)cm. Pod zemí vytváří kulatou cibuli průměru 1 - 2cm. Stonek je 3boký, na bázi mívá 2 listy, ty jsou šedozelené, kopinaté až čárkovité, kýlnaté, drobně zubaté, dlouhé 8 - 25cm, široké do 2cm a na spodní straně s výrazným žebrem. Květenstvím je až 30tikvětý lichookolík na až 3cm stopce s pochvatým toulcem, vlastní květy jsou bílé, nálevkovité až hvězdovité, korunní lístky eliptické, tupé, vnitřní užší, lesklé a dlouhé 0,7 - 0,9 (i 1,2)cm. Plodem je tobolka délky 4,5 - 6,5mm. Je výrazně aromatický. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. philippi

Vyhovují mu traviny, pole a suché dobře propustné půdy. U nás není plně mrazuvzdorný.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>