

Allium roseum (Česnek růžový)

synonyma: *Allium africanum*, *Allium ambiguum*, *Allium amoenum*, *Allium carneum*, *Allium cirrhosum*, *Allium confertum*, *Allium illyricum*, *Allium incarnatum*, *Allium majale*, *Allium moly* var. *ambiguum*, *Allium odoratissimum*, *Allium pandatarium*, *Allium pulchrum*, A. f. *albiflorum*, A. f. *bulbillosum*, A. f. *carneum*, A. f. *majale*, A. subsp. *ambiguum*, A. subsp. *bulbiferum*, A. subsp. *majale*, A. subsp. *odoratissimum*, A. subsp. *pandatarium*, A. var. *bulbiferum*, A. var. *bulbulliferum*, A. var. *carneum*, A. var. *grandiflorum*, A. var. *humile*, A. var. *insulare*, A. var. *majale*, A. var. *odoratissimum*, A. var. *perrotii*, *Allium rubicundum*, *Allium subalbidum*, *Allium tenorei*, *Cepa flexuosa*, *Molium roseum*

čeleď: Alliaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Egejské ostrovy, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libye, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Velká Británie

Pochází ze středozeší. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 60 (i 75)cm. Pod zemí vytváří vejčitou až hruškovitou cibuli o šířce do 2cm s nahnědlou slupkou a mnoha dceřnými cibulkami. Stonky jsou přímé, bledězelené, oblé a hladké. Listy vyrůstají po 2 - 4ks z báze, jsou tlusté, přímé, čárkovité, hluboce rýhované, na okrajích celokrajné, dlouhé 12 - 35cm, široké (0,4 -) 0,5 - 1,2 (i 1,5)cm, na okraji drobně osténkaté a za květu uvadají. Kvete narůžovělými až 3cm květy v kulovitém 5 - 30četném okolíku o průměru 7cm, mají 2 - 3,5cm stopku, korunní lístky jsou zvonkovité, dlouhé 0,7 - 1,2cm, růžové až červenorůžové a cípy jsou eliptické až podlouhlé, na vrcholu vroubkované. Plodem je tobolka délky 3 - 5,5 (i 6)mm s černými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bulbilliferum* - květy drobné, růžové, v květenství i pacibulky
- var. *coacervatum*
- 'Grandiflorum' - květy větší, růžové
- subsp. *tourneuxii*

Vyhovují mu sušší hlinitopísčité a dobře propustné kamenité půdy na plném slunci, nap. na okrajích lesů, křovinách, loukách, sadech, atp.

<https://www.rostliny.net/>