

Allium schoenoprasum (Pažitka pobřežní)

synonyma: *Allium acutum*, *Allium alpinum*, *Allium broteroi*, *Allium buhseanum*, *Allium carneum*, *Allium coloratum*, *Allium foliosum*, *Allium glaucum*, *Allium idzuense*, *Allium lusitanicum*, *Allium montanum*, *Allium palustre*, *Allium punctulatum*, *Allium purpurascens*, *Allium raddeanum*, *Allium reflexum*, *Allium riparium*, *Allium roseum*, *Allium schmitzii* var. *duriminium*, A. f. *albiflorum*, A. f. *purpuratum*, A. subsp. *alpinum*, A. subsp. *orosiae*, A. subsp. *pumilum*, A. subsp. *riparium*, A. subsp. *sibiricum*, A. var. *albidum*, A. var. *alpinum*, A. var. *alvarense*, A. var. *brevispathum*, A. var. *broteroi*, A. var. *buhseanum*, A. var. *caespitans*, A. var. *duriminium*, A. var. *foliosum*, A. var. *idzuense*, A. var. *laurentianum*, A. var. *lusitanicum*, A. var. *pumilum*, A. var. *sibiricum*, *Allium scorodoprasum* var. *alvarense*, *Allium sibiricum*, *Allium sibiricum* var. *schoenoprasoides*, *Allium tenuifolium*, *Allium ubanicum*, *Allium udanicum*, *Ascalonicum schoenoprasum*, *Cepa schoenoprasa*, *Cepa tenuifolia*, *Porrum schoenoprasum*, *Porrum sibiricum*, *Schoenissa rosea*, *Schoenissa schoenoprasa*, *Schoenoprasum vulgare*

čeleď: Alliaceae

oblasti: Afganistán, Alberta, Aljaška, Altaj, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Indie, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Středozeří, Švýcarsko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste na celé severní polokouli v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (7 -) 15 - 45 (i 55)cm. Pod zemí vytváří drobné kulovité cibule délky do 2cm a šířky 5mm. Vyrůstají z ní 1 - 2 listy, které jsou tmavězelené, kulaté, druté, trubkovité, dlouhé 10 - 15 (i 35)cm a v průměru mají 0,5 - 1 (i 2)mm. Květenstvím je kulovitý lichookolík o průměru do 2cm v odstínech bílé až fialové a korunní lístky jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 1 - 1,2cm. Plodem je tobolka délky 2,5 - 3mm. Obsahuje velké množství vitamínu B2 a C. Cibulky nejsou příliš výrazné. Pěstuje se především díky nati, která slouží drobně nakrájená k ochucení pomazánek, polévek, atp. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album' - bílé květy
- 'Albifloss' - bělavé květy
- 'Album' - bělavé květy
- 'Corsican White'
- 'Diva' - květy fialové
- 'Forescate' - dorůstá výšky 30cm; květy růžové
- var. *latiorifolium*
- subsp. *orosiae*
- subsp. *schoenoprasum* (Pažitka pobřežní pravá)
- 'Wellington White' - květy bílé

Má ráda vlhkou i písčitou zeminu. Ideální jsou tedy břehy, vlhké louky, atp. Je zcela mrazuvzdorná. Dokáže růst na plném slunci i ve stínu a i během zimy (pozor na příliš vysokou vlhkost).

Množí se semeny neb dělením cibulek.

<https://www.rostliny.net/>