

Senecio sylvaticus (Starček lesní)

synonyma: Senecio areolatus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Havajské ostrovy, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Massachusetts, Michigan, Německo, New Jersey, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Zakavkazsko

Roste od Portugalska po evropské Rusko jako jednoletka a zavlečené bylo do USA, Havajské a Chathamské ostrovy. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 60 (i 90)cm. Povrch je pavučinovitě ochlupený. Listy jsou střídavé, obvejčité až podlouhlé, peřenosečné až peřenolaločné, zubaté, dlouhé 3 - 7 (i 12)cm, široké 1 - 3 (i 4)cm. Květenstvím je vrcholík ze žlutých úborů o průměru 3,5 - 5,5mm, zákrov je dlouhý 7 - 9mm, široký 3 - 4mm, tvoří ho 13 (i 21) zákrovních listenů, listeny zákrovečku mají 1/5 délky zákrovu, okvětních lístků je max. 8, jazyk je dlouhý 1 - 2mm. Plodem je nažka délky 2 - 2,5mm s chmýrem délky 4,5 - 5,5mm.

Vyhovují mu lesní světliny, písčiny a okraje cest.

<https://www.rostliny.net/>