

Allium subhirsutum (Česnek ochlupený)

synonyma: Allium album, Allium brachystemon, Allium ciliare, Allium ciliatum, Allium clusianum, Allium graminifolium, Allium hirsutum, Allium loiseleurii, Allium niveum, A. subsp. ciliare, A. subsp. ciliatum, A. var. ciliatum, A. var. corbariense, A. var. hellenicum, Allium subvillosum var. clusianum, Allium tinei, Iulus niveum, Iulus subhirsutum, Kalabotis clusianum

čeleď: Alliaceae

oblasti: Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Egejské ostrovy, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Makedonie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Turecko

Pochází ze středozemí. Roste ve větších porostech. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 35 (i 55)cm. Pod zemí vytváří kulovitou cibuli o průměru do 1,5cm se 2 - 3ma listy. Stonek je kulatý a široký 2 - 3mm. Listy jsou čárkovité, zejména na okrajích brvité, dlouhé do 40cm a při květu zasychají. Květenstvím je 1/2kulatý řídký lichookolík průměru 3 - 7cm, vlastní květy mají až 4cm stopku, jsou hvězdicovité, bílé a aromatické. Plodem je tobolka délky 3 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. bistonense
- subf. convexum
- subf. minimum
- subf. rubellum

Vyhovují mu suché, písčité nebo kamenité půdy, pastviny, úhory, atp.

<https://www.rostliny.net/>