

## Allium vineale (Česnek viničný)

synonyma: Allium affine, Allium arenarium, Allium assimile, Allium campestre, Allium compactum, Allium descendens, Allium laxiflorum, Allium laxiflorumAllium littoreum, Allium littoreum, Allium margaritaceum var. bulbiferum, Allium nitens, Allium purshii, Allium rilaense, Allium rotundum, Allium sphaerocephalum, Allium subvineale, A. subsp. affine, A. subsp. asperiflorum, A. subsp. capsuliferum, A. subsp. compactum, A. subsp. kochii, A. var. affine, A. var. asperiflorum, A. var. bulbiferum, A. var. capsuliferum, A. var. compactum, A. var. descendens, A. var. kochii, A. var. multiflorum, A. var. nitens, A. var. purshii, Getuonis vinealis, Porrum capitatum, Porrum vineale

čeleď: Aliaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v celé Evropě. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,24 -) 0,4 - 1 (i 1,1)m. Listy mají tmavší modrozelenou barvu a jsou dlouze čárkovité, bez řapíků, na průřezu téměř okrouhlé, rýhované. Podobají se pažitce. Kvete v kulovitém lichookolíku, vlastní květy mají korunní lístky fialové délky 2,5 - 3,5 (i 4,5)mm, toulec je před rozkvětem protažený v zobánek délky 0,5 - 1cm. Po odkvětu vytváří rozmnožovací cibulky. Plodem je tobolka délky 3 - 3,5mm Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. capsuliferum

Vyhovují mu zaplavovaná místa, okopaniny a půda bohatá na živiny nejlépe bez vápna, křoviny, příkopy, trávníky, atp.

<https://www.rostliny.net/>