

## Dipsacus fullonum (Štětka planá)

synonyma: *Dipsacus arcimusci*, *Dipsacus botteri*, *Dipsacus carminatorius*, *Dipsacus divaricatus*, *D. f. ternatus*, *D. var. sylvestris*, *Dipsacus horridus*, *Dipsacus meyeri*, *Dipsacus mirabilis*, *Dipsacus morisonii*, *Dipsacus orsini*, *Dipsacus palustris*, *Dipsacus purpurascens*, *Dipsacus silvester*, *Dipsacus sinuatus*, *Dipsacus sylvestris*, *Dipsacus sylvestris f. albidus*, *Dipsacus vulgaris*

čeleď: Dipsacaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Dalmácie, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Středozeří, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Evropě a západní Asii jako dvouletka. Dorůstá výšky 0,7 - 1,5 (i 2)m. Lodyha je větvená a ostnitá. Prvním rokem vytváří pouze přízemní listovou růžici z obvejčitých krátce řapíkatých listů s vroubkovaným okrajem. V druhém roce teprve roste do výšky se vstřícnými až 35cm dlouhými listy a mohou být na řídce ostnité. Kvete v 3 - 11cm dlouhých a 2,5 - 6cm širokých válcovitých strboulech světlefialovými květy s korunou délky (1,1 -) 1,2 - 1,5 (i 1,6)cm, listeny jsou špičaté, mírně zahnuté a ostnité. Plodem je světlehnědá nažka délky 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fullonum* (Štětka planá pravá)
- subsp. *sativus*

Vyhovují mu okraje cest, křoviny, skládky, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>