

Cyathea atropurpurea

čeleď: Cyatheaceae

oblasti: Luzon, Mindanao, Mindoro

Roste na Filipínách. Kmen je slabý, vytrvale pokrytý jemně dělenými bazálními lístky přimknutými k bázi listů. Listy mají stopky tmavé, pokryté šupinami, šupiny jsou hnědé, tmavé, lesklé, dlouhé do 1cm, široké 1,5mm, čepel je přeměněná na úzké řídlo podél žilek a žeber v počtu až 6ti ks, mají délku do 4cm, mají 6 párů lístečků, úkrojky jsou dlouhé do 8mm, ostatní část stopek a vřeteno je tmavé, lesklé, vřetena lístků bývají světlejší, načervenalá, normální lístky jsou dlouhé do 30cm, lístečky bývají mírně 2tvárné, fertilní menší, nejspodnější mají 2 - 3mm stopku, největší jsou dlouhé do 8cm, široké 7mm, nejspodnější 1 - 2 párů úkrojků bývají občas prakticky volné, ostatní lístky laločnaté až k 2mm od žebra, žilnatinu tvoří do 6ti párů žilek, čepel je tuhá, úkrojky drobně vroubkované a zakulacené, šupiny na žebrech jsou úzké, tmavé, lesklé, na okraji světlé občas se štětinami a přechází ve světlé puchýřnaté šupiny.

<https://www.rostliny.net/>