

Euphorbia myrsinites (Pryšec myrtovitý)

synonyma: *Endoisila myrsinites*, *Euphorbia curtifolia*, *E. subsp. pontica*, *Euphorbia pectinata*, *Euphorbia pontica*, *Euphorbia rigida*, *Euphorbion myrsinitum*, *Galarhoeus myrsinites*, *Murtekias myrsinites*, *Tithymalus myrsinites*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Baleáry, Černé moře, Idaho, Írán, Itálie, Kolorado, Kréta, Krym, Malá Asie (Anatolie), Nové Mexiko, Ontario, Oregon, Střední Asie, Švýcarsko, Utah, Washington, Wisconsin

Roste ve středozeší až po střední Asii jako stálezelená trvalka v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm a šířky až 1m. Větve jsou dužnaté, stálezelené, dlouhé, poléhavé až vystoupavé, široké 4 - 6mm aolistěné. Listy jsou střídavé, modrozelené či sivozelené s bílými okraji, sukulentní, šupinaté, 3úhlé, na konci zašpičatělé a dlouhé (1 -) 2 - 3 (i 3,5)cm. Květenství tvoří 5 - 12 paprsků v lichookolíku, listeny jsou široce srdčité, žlásky ve tvaru 1/2měsíce se 2ma rohy, žluté až červené a vlastní květy jsou žlutozelené. Plodem je občas bradavičnatá tobolka délky 5 - 7mm obsahující 3 semena.

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *rechineri*/*E. rechingeri*/*Tithymalus rechineri* - listy na okraji červené; květy červené

Vyhovuje mu plné slunce, teplo a dobře propustný ideálně vápencový substrát. Roste na kamenitých svazích a skalách.

<https://www.rostliny.net/>