

Cyathea atrox

čeleď: Cyatheaceae

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. atrox - kmen výšky 6 - 7m; 20 - 30 listů délky 1,25 - 1,75m, stopky dlouhé 30 - 50cm, trnité, trny tmavé, lesklé, dlouhé 3 - 5mm, šupiny na bázi dlouhé do 5cm, široké 3 - 5mm, světlehnědé, na okraji štětinaté a ochlupené, zbývající část stopky bradavičnatá, trnitá, spodní lístky mírně zakrnělé, nejdelší dlouhé 30 - 45cm, největší lístečky dlouhé 6,5 - 8 (i 10)cm, široké 1,3 - 1,5 (i 2)cm, úkrojky sahají až k žeburu, na bázi stažené, 1 - 2 bazální zcela volné, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek, úkrojky tuhé, celokrajné až hluboce vroubkované, vřeteno lístků světlé, bradavičnaté, na spodní straně žeber jsou řídké protáhlé hnědé šupiny s tmavými štětinami na okrajích a velké světlé šupiny
- var. inermis - stopky listů mají mnoho kuželovitých bradaviček výšky 0,5mm, stopky mají šupiny délky 6 - 10cm, šířky 6mm, lístečky bývají dlouhé 4,5cm, široké 1,2cm, okraje ohnuté a stočené, vřeteno lístků mívá malé světlé šupinky

<https://www.rostliny.net/>