

Crataegus crus-galli (Hloh kuří noha)

synonyma: *Crataegus acutifolia*, *Crataegus acutifolia* var. *insignis*, *Crataegus algens*, *Crataegus arduennae*, *Crataegus barrettiana*, *Crataegus bushii*, *Crataegus canbyi*, *Crataegus cherokeensis*, *Crataegus cocksii*, *C. f. vulgaris*, *C. var. barrettiana*, *C. var. bellica*, *C. var. capillata*, *C. var. exigua*, *C. var. leptophylla*, *C. var. macra*, *C. var. oblongata*, *C. var. pachyphylla*, *Crataegus danielsii*, *Crataegus denaria*, *Crataegus exigua*, *Crataegus fecunda*, *Crataegus fontanesiana*, *Crataegus hannibalensis*, *Crataegus helvina*, *Crataegus laurifolia*, *Crataegus livoniana*, *Crataegus lucida*, *Crataegus mohrii*, *Crataegus operta*, *Crataegus palliata*, *Crataegus palmeri*, *Crataegus permixta*, *Crataegus persistens*, *Crataegus regalis*, *Crataegus regalis* var. *paradoxa*, *Crataegus sabineana*, *Crataegus salicifolia*, *Crataegus schizophylla*, *Crataegus shinersii*, *Crataegus signata*, *Crataegus sublobulata*, *Crataegus subpilosa*, *Crataegus tantula*, *Crataegus tenax*, *Crataegus triumphalis*, *Crataegus unguis*, *Crataegus vallicola*, *Mespilus crus-galli*, *Mespilus crus-galli* var. *salicifolia*, *Mespilus cuneiformis*, *Mespilus cunifolia*, *Mespilus lucida*, *Mespilus watsoniana*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi opadavé rostliny. Dorůstá výšky (6 -) 8 - 10 (i 12)m a šířky 10m v rozložitém habitu, často se zploštělou korunou. Barva borky se s postupným stářím mění z hladké šedé na tmavohnědou. Konce malých větví jsou zakončeny trny délky 3 - 10 (i 15)cm. Střídavé listy jsou tuhé, kožovité, lesklé, obvejčité až podlouhlé nebo obkopinaté, tmavězelené, dlouhé 2 - 10cm, mělce laločnaté s výraznými zuby na okraji, spodní strana je světlejší, na podzim oranžové nebo červené a řapík má délku 0,4 - 1,2cm. Květenstvím je chocholík šířky 5 - 7cm, vlastní květy jsou bílé až růžové velikosti 1,5cm. Plodem je červená až špinavě oranžová malvička průměru 0,8 - 1,2cm, dužina je červená a obsahuje 2 pečičky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *arbutifolia* - listy obvejčité až eliptické, dlouhé i více než 1,5 - 5cm; plody dlouho vytrvávají
- var. *capillata* - květenství ochlupené
- 'Cruzam'/'Crusader' - kulovitý habitus; výška i šířka 4,5m; nemá trny; květy bílé; plody červené
- 'Hooks' - hustý kulovitý habitus; výška i šířka 5 - 7m; trny řídké; listy tmavězelené; plody červené velikosti 1,3cm
- 'Inermis'/var. *inermis* - bez trnů; listy lesklé, tmavězelené
- var. *linearis* - povrch holý; listy úzké
- var. *oblongata* - menší vodorovně větvený habitus; listy úzce eliptické; plody zářivé
- 'Pyracanthifolia' - široký rozkladitý habitus; listy více lopatkovité
- 'Salicifolia' - větve vodorovné, řídce trnité; listy spíše kopinaté
- 'Vaughan'/'Vaughnii' - vzrůstný habitus; listy na podzim červené; plody bohaté, červenooranžové a velikosti 5mm

<https://www.rostliny.net/>