

## Crataegus cuneata (Hloh klínovitý)

synonyma: *Crataegus alnifolia*, *Crataegus argyi*, *Crataegus chantcha*, *C. f. pleniflora*, *C. var. shangnanensis*, *Crataegus kulingensis*, *Crataegus spathulata*, *Crataegus stephanostyla*, *Mespilus cuneata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Japonsko, Mongolsko, V Čína

Roste ve východní Číně, Japonsku a Mongolsku v podobě opadavého hustě větveného rozložitého keře. Trny bývají štíhlé, dlouhé 5 - 8mm. Větve jsou v mládí růžovofialovohnědé. Listy jsou obvejčité, asymetricky 2x pilovité, v hodní 1/2 3 - 5x laločnaté, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 4,5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenstvím je chocholík průměru 2 - 2,5cm obsahující 5 - 7 květů, vlastní květy mají 1cm stopku, kališní lístky jsou 3úhle vejčité, dlouhé 4mm, korunní lístky jsou prakticky kulaté nebo obvejčité a dlouhé 6 - 7mm. Plodem je červená nebo žlutá kulovitá malvička průměru 1 - 2cm obsahující 4 - 5 pečiček. Je vhodný pro bonsajové pěstování.

Vyhovují mu lesy, okraje vod, mýtiny.

<https://www.rostliny.net/>