

Crataegus laevigata (Hloh obecný)

synonyma: *Crataegus calycina* var. *walokochiana*, *Crataegus coriacea*, *Crataegus cuneato-trifida*, *C. subsp. carnoviensis*, *C. subsp. microphylla*, *C. subsp. palmstruchii*, *C. subsp. vulgaris*, *C. subsp. walokochiana*, *C. var. carnoviensis*, *C. var. integrifolia*, *C. var. microphylla*, *C. var. vulgaris*, *Crataegus oxyacantha*, *Crataegus oxyacantha* f. *auriculata*, *Crataegus oxyacantha* f. *ellipticifolia*, *Crataegus oxyacantha* f. *glabrata*, *Crataegus oxyacantha* f. *laevigata*, *Crataegus oxyacantha* f. *vernica*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *carnoviensis*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *oxyacanthoides*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *palmstruchii*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *polygyna*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *vernica*, *Crataegus oxyacantha* subsp. *walokochiana*, *Crataegus oxyacantha* var. *auriculata*, *Crataegus oxyacantha* var. *eriocarpa*, *Crataegus oxyacantha* var. *globosa*, *Crataegus oxyacantha* var. *integrifolia*, *Crataegus oxyacantha* var. *laevigata*, *Crataegus oxyacantha* var. *mathei*, *Crataegus oxyacantha* var. *microcarpa*, *Crataegus oxyacantha* var. *microphylla*, *Crataegus oxyacantha* var. *microoxyacantha*, *Crataegus oxyacantha* var. *obtusata*, *Crataegus oxyacantha* var. *obtusiloba*, *Crataegus oxyacantha* var. *ovoxyacantha*, *Crataegus oxyacantha* var. *oxyacanthoides*, *Crataegus oxyacantha* var. *palmstruchii*, *Crataegus oxyacantha* var. *vulgaris*, *Crataegus oxyacanthoides*, *Crataegus oxycantha* subsp. *walokochiana*, *Crataegus palmstruchii*, *Crataegus palmstruchii* subsp. *rhenana*, *Crataegus subinermis*, *Crataegus walokochiana*, *Mespilus digyna*, *Mespilus intermedia*, *Mespilus laevigata*, *Mespilus oxyacantha* var. *integrifolia*, *Mespilus oxyacantha* var. *obovata*, *Mespilus oxyacantha* var. *obtusata*, *Mespilus oxyacanthoides*, *Oxyacantha obtusata*, *Oxyacantha vulgaris*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Albánie, Alpy, Anglie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, J Švédsko, Karpaty, Katalánsko, Kosovo, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Michigan, Německo, Nizozemí, Ontario, Polsko, Pyreneje, Quebec, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Afrika, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Washington, Wisconsin

Roste v Evropě, severní Africe a Malé Asii v podobě opadavého rozložitého keře nebo stromu s hustou kulovitou korunou. Dorůstá výšky i šířky 2 - 10 (i 12)m. Trny jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Borky je deskovitě rozpukaná, s postupujícím stářím se pohybuje od světlehnědé hnědé po světle šedou a deskovitě rozpukanou. Větve jsou trnité, v mládí holé, ostře zakončené 0,5 - 2 (i 3)cm trny, pupeny jsou malé a vejčité kulovité. Palisty na fertálních větvích jsou asymetricky pilovité a žláznatě zubaté. Listy jsou střídavé, tmavě zelené, lesklé, vejčité, kosočtvercovité nebo obvejčité, mohou být v horní 1/2 3 - 5x mělce laločnaté, dlouhé (1,5 -) 2 - 5cm, báze je klínovitá, spodní strana je modrozelená, spodní listy jsou celokrajné, na vrcholu zubaté a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 2cm. Květenstvím je vzpřímená chocholičnatá 5 - 12tkvětá vrcholová lata, vlastní květy jsou bílé nebo růžové, průměru 1,5 - 2cm, prašníky jsou červené, kališní lístky 3úhlé a vydávají nepříjemný zápach. Plodem je tmavěčervená malvice o průměru (0,6 -) 0,7 - 1,2cm se 2 - 3mi pecičkami a moučnou dužinou v polopřevislém plodenství. Je jedlá, ale málo chutná. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurea'/var. *aurea*/*C. oxyacantha* 'Aurea' - plody žluté
- 'Auriculata' - palisty stopkaté, velké, hluboce vroubkované; listy vejčitékulovité, dlouhé 3 - 5cm; plody tmavěčervené zpravidla se 2mi pecičkami
- 'Autumn Glory' - výška 4,5 - 6m, šířka 6m; hustý, zpravidla s pruty; listy lesklé, tmavězelené, tlustější; květy bílé; plody lesklé, červené, větší
- 'Candidoplana' - květy plnokvěté, bílé
- subsp. *carnoviensis* - Krnov; výška 2 - 3m; trny dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy mírně kožovité, světlezelené, na sterilních větvích dlouhé 2 - 4cm, široké 1,5 - 3cm, vejčité kosočtvercovité, hluboce 3laločné, laloky zpravidla dále 3laločné, báze klínovitá, celokrajná, řapík křídlatý, na fertálních

- větvích dlouze vejčité, mělce 3laločné, vroubkovaně pilovité, báze klínovitá; květenství 2 - 7 mikvěté, vlastní květy bílé; plody červené, obvejčité, dlouhé 0,8 - 1 cm, široké 6 - 8 mm, obsahují 2 (i 3) pečičky; kališní cípy 3úhlé, přilehlé
- 'Crimson Cloud' - výška 7,5 m, šířka 5,4 m; květy jednoduché až plnokvěté, červené s bílým středem
 - 'Francois Rigaud' - větve mají žlutou kůru; plody žluté
 - 'Gireoudii'/C. x media 'Gireoudii' - široký vzpřímený keř až strom; výška 5 m, zpravidla nižší; listy tupě laločnaté, v mládí růžové až bíle skvrnité, pozdější listy spíše zelené; květy bílé; plody velké, lesklé a tmavěčervené
 - subsp. *laevigata*/C. *oxyacantha* subsp. *oxyacantha* (Hloh obecný pravý) - listy dlouhé 1,5 - 3,5 cm, na spodní straně řídce ochlupené; plody kulovité, dlouhé 0,6 - 1 cm
 - 'Masekii' - květy růžové, spodní strana bělavá, časem blednou
 - subsp. *microphylla* - úzký keřovitý habitus; trny dlouhé 0,5 - 1,2 cm; palisty zahnuté, zastříhovaně pilovité; listy malé, vejčitékulovité, drobně pilovité se 3 (i 5)ti malými širokými a tupými laloky, báze celokrajná; kališní cípy krátké, 3úhle vejčité, koruna průměru 0,8 - 1,3 cm; plody červené průměru 0,9 - 1,2 cm
 - 'Mutabilis' - květy zpočátku růžové, báze bílá
 - subsp. *nemorensis* - listy kosočtvercovité, 5 - 7 (i 9)tilaločné s ostrými zářezy do 1/2 pološířky čepele, dlouhé 5 cm, široké 4 cm, báze klínovitá; plody eliptické až kulovité, červené, dlouhé 1,2 - 1,4 cm, široké 1 - 1,4 cm, obsahují 2 pečičky, kališní cípy kopinaté, vzpřímené nebo rozložené
 - 'Paul's Scarlet'/'Coccinea Plena'/'Kermesiana Plena'/C. x media 'Paul's Scarlet'/C. *monogyna* 'Kermesina Plena'/C. *monogyna* var. *paulii* - asymetricky rozkladitá koruna; výška i šířka 4 - 8 m; květy růžové, červené a plnokvěté
 - 'Pink Corkscrew' - větve zkroucené; květy růžové; pomalejší růst
 - 'Plena' - asymetricky rozkladitá koruna; výška do 10 m; květy plnokvěté, bílé, později mírně narůžovělé
 - 'Punicea'/var. *punicea*/C. x media 'Punicea' - květy růžové a červené, středy bílé, průměru 2 cm
 - 'Punicea Flore Pleno' - květy plnokvěté
 - 'Punicea Plena'/C. x media 'Punicea Plena' - květy plnokvěté, tmavěružové
 - 'Rosea'/var. *rosea* - květy světlorůžové, střed bělavý
 - 'Rosea Flore Pleno' - květy plnokvěté, růžové
 - 'Rubra' - květy bílé; plody červené, dlouhé 0,9 - 1 cm
 - 'Rubra Plena' - asymetricky rozkladitá koruna; květy růžové, plnokvěté
 - 'Superba' - vzpřímený beztrnný habitus; výška 4,5 - 6 m, šířka 3 - 4,5 m; listy lesklé, zelené; květy červené, střed bílý

Vyhovují mu jílovité půdy v lesích a jeho okrajích, křovinách, haldách, lužní lesy, atp. na plném slunci v půdách s dostatkem živin. Je mrazuvzdorný do -34°C.

<https://www.rostliny.net/>