

Laburnum anagyroides (Štědřenec odvislý)

synonyma: Cytisus laburnum, Laburnum vulgare

čeleď: Fabaceae

oblasti: Apeniny, Britská Kolumbie, Česká republika, Dalmácie, Francie, Irsko, J Alpy, Kalifornie, Kréta, Massachusetts, Německo, Pákistán, Patagonie, S Itálie, Švýcarsko, Utah, Washington

Roste v horách střední a jižní Evropy v podobě opadavého keře nebo stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky (2 -) 4 - 13 (i 15)m a šířky 3 - 8m. Kromě spodní strany mladých listů je celý povrch holý. Borka je tmavě šedá a rozpukaná. Větve jsou metlovité, v mládí šedozelelé a přítiskle ochlupené. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky eliptické, vejčité nebo obvejčité, zakulacené (i s hrotem), tmavězelené, dlouhé 3 - 8cm, široké 2,5cm, báze zakulacená až široce klínovitá, spodní strana je naředlá, přítiskle ochlupená a řapík má délku 2 - 6 (i 6,3)cm. Převíslé 14 - 25tičetné hrozny jsou dlouhé 10 - 20 (i 40)cm, vlastní květy mají kalich asymetrický, zvonkovitý, 2pyský, velikosti 5mm, koruna je žlutá, dlouhá 2cm, pavéza na bázi nahnědlá, stopky jsou kratší květů a listence jsou čárkovité. Plodem je plstnatý světlehnědý lusk délky 4 - 6 (i 8)cm a obsahuje 2 - 6 (i 9) černých mírně okřídlených semen. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alschingeri*/L. *alschingeri*/Cytisus *alschingeri* - Tyrolsko, severní Itálie, Dalmácie, Kréta; výška 2 - 4m; lístky eliptické, později kožovité, na spodní straně bíle ochlupené; květenství zpravidla polovzpřímené, hrozny krátké, kalich 2pyský, spodní pysk delší, nehet pavézy vyčnívající mimo kalich
- subsp. *anagyroides* (Štědřenec odvislý pravý)
- 'Arnold Weeping'
- 'Aureum'/f. *aureum* - listy žlutě zelené, rašící žluté
- 'Bullatum'/f. *bullatum*/f. *crispum*/f. *involutum*/f. *monstrosum* - lístky lžičkovitě prohnuté s okrajem směřujícím vzhůru
- 'Carlieri'/var. *carlieri* - lístky menší, užší, obvejčité až úzce kopinaté, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 4 - 5mm; květenství krátké, 1/2vzpřímené, zpravidla po 2 - 3ks, květy světležluté; plody obsahují pouze několik semen
- 'Erect' - menší stromovitý habitus; větve vzpřímené
- 'Chrysophyllum' - listy žluté
- 'Incisum' - lístky hluboce zastříhované
- 'Pendulum'/var. *pendulum* - větve i větvičky převislé
- 'Quercifolium'/var. *quercifolium* - lístky mají 2 - 3 páry chobotnatých laloků; korunní lístky zubaté, křídla mají na horní straně laloky
- 'Serotinum'/'Autumnale'/'Semperflorens'/f. *autumnale*/f. *semperflorens*/var. *autumnale* - remontující, druhé kvetení již není tak bohaté
- 'Sessilifolium' - listy husté, krátce řapíkaté
- 'Variegatum' - listy žlutopestré

Řez není nutný, ale pokud jej chcete provést, vhodná doba je uprostřed zimy nebo na začátku jara. Nemá speciální nároky na půdu, lepší je sušší, vápenitá a plně slunce. Dobře snáší znečištěné prostředí. Je plně mrazuvzdorný.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>