

Begonia oaxacana

synonyma: *Begonia luxii*, *Begonia luxii* var. *pilosior*, *B.* var. *pilosula*, *B.* var. *stenoptera*, *Begonia plagiata*, *Begonia pubipedicella*, *Begonia serrulatoala*, *Begonia stenoptera*

čeleď: Begoniaceae

oblasti: Guatemala, Kostarika, Oaxaca, Panama, Salvador

Roste v Mexiku, Salvadoru a Guatemale v podobě i epifytické byliny až polokeře. Stonky jsou vzpřímené nebo popínavé, vysoké 0,3 - 1,5m, široké 0,2 - 1,2cm, mohou být ochlupené a zelené nebo červené. Palisty jsou opadavé, podlouhlé, celokrajné a dlouhé 1,2cm. Listy jsou vejčité, špičaté, drobně pilovité, mohou být oboustranně řídce ochlupené, dlouhé 6 - 18cm, široké 3 - 11cm, báze srdčitá, žilnatina dlanitě 5 - 7mižilná a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm. Květenstvím je chudý oboupohlavný vrcholík, má 2 - 5cm stopku, listeny opadávají pozdě, jsou široce vejčité až prakticky kulaté, tupé, dlouhé 0,6 - 1,2cm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopku, samčí mají 4 korunní lístky, vnější jsou kulaté až široce vejčité, dlouhé 1 - 1,5cm, růžové, vnitřní jsou mírně kratší, obvejčité, bílé, samičí mají 3 korunní lístky, vnější 2 jsou prakticky kulaté, dlouhé 0,8 - 1,4cm, vnitřní jsou menší a mírně obvejčité až podlouhlé. Plodem je vzpřímená eliptická tobolka délky 1 - 1,5cm, může být ochlupená, mívá 3 křídla a eliptická semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *stenoptera*/*B. stenoptera* - Kostarika, Panama, Guatemala; řapíky dlouhé 5 - 20cm; květy mají 0,6 - 2,2cm stopku, samčí korunní lístky dlouhé 5mm; tobolky mají stejná křídla

<https://www.rostliny.net/>