

Begonia peltata

synonyma: *Begonia auriformis*, *Begonia incana*, *Begonia incana* var. *auriformis*, *Begonia kellermanii*, *Begonia peltata*, *B.* var. *auriformis*, *Rachia auriformis*, *Rachia incana*, *Rachia peltata*

čeleď: Begoniaceae

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale. Kmínky jsou dřevité, vzpřímené, rovné, dlouhé 10 - 90cm a široké 1cm. Palisty jsou pozdě opadavé, široce kopinaté, celokrajné, hnědé, ochlupené a dlouhé 1,5cm. Listy jsou štítnaté, široce vejčité, zašpičatělé, mělce vykrajovaně zubaté až celokrajné, v mládí oboustranně hustě ochlupené, dlouhé 6 - 15cm, široké 4 - 10cm, báze zakulacená, žilnatina je dlanitě 7 - 8mižilná a řapíky jsou dlouhé 3 - 15cm. Květenství je vrcholičnaté, chudé, má 5 - 39cm stopku, listeny záhy opadavé, úzce obvejčité, samčí květy mají 0,4 - 1,4cm stopku, 4 bílé korunní lístky, vnější jsou kulaté, dlouhé 0,5 - 1cm, vnitřní menší, lopatkovité, samičí mají 3 korunní lístky a vnitřní jsou menší. Plodem je eliptická tobolka s prakticky stejnými křídly.

<https://www.rostliny.net/>