

Canna indica (Dosna indická)

synonyma: *Canna achiras*, *Canna altensteinii*, *Canna amabilis*, *Canna ascendens*, *Canna aurantiaca*, *Canna aureovittata*, *Canna bidentata*, *Canna bifida*, *Canna brasiliensis*, *Canna carnea*, *Canna cearensis*, *Canna cinnabarina*, *Canna coccinea*, *Canna coccinea* f. *flaviflora*, *Canna coccinea* var. *bicolor*, *Canna coccinea* var. *concolor*, *Canna coccinea* var. *floribunda*, *Canna coccinea* var. *limbata*, *Canna commutata*, *Canna compacta*, *Canna concinna*, *Canna crocea*, *Canna densiflora*, *Canna densifolia*, *Canna discolor*, *Canna discolor* var. *rubripunctata*, *Canna discolor* var. *viridifolia*, *Canna edulis*, *Canna ehrenbergii*, *Canna ellipticifolia* var. *coccinea*, *Canna ellipticifolia* var. *lutea*, *Canna ellipticifolia* var. *patens*, *Canna ellipticifolia* var. *rubra*, *Canna exigua*, *Canna eximia*, *Canna flavescens*, *Canna floribunda*, *Canna formosa*, *Canna fulgida*, *Canna heliconiifolia*, *Canna heliconiifolia* var. *xalapensis*, *Canna humilis*, *C. f. rubroaurantiaca*, *C. subsp. orientalis*, *C. var. coccinea*, *C. var. edwardsii*, *C. var. flava*, *C. var. karsteniana*, *C. var. limbata*, *C. var. lutea*, *C. var. maculata*, *C. var. nepalensis*, *C. var. patens*, *C. var. rubra*, *C. var. sanctae-rosae*, *C. var. variegata*, *C. var. warszewiczii*, *Canna juncea*, *Canna laeta*, *Canna lagunensis*, *Canna lambertii*, *Canna lanuginosa*, *Canna leptochila*, *Canna lutea*, *Canna lutea* var. *aurantiaca*, *Canna lutea* var. *maculata*, *Canna lutea* var. *pallida*, *Canna macrophylla*, *Canna maculata*, *Canna montana*, *Canna moritziana*, *Canna nepalensis*, *Canna occidentalis*, *Canna orientalis* var. *flava*, *Canna pallida*, *Canna pallida* var. *maculata*, *Canna patens*, *Canna patens* var. *limbata*, *Canna platyphylla*, *Canna plurituberosa*, *Canna poeppigii*, *Canna polyclada*, *Canna polymorpha*, *Canna portoricensis*, *Canna pruinosa*, *Canna pulchra*, *Canna recurvata*, *Canna rotundifolia*, *Canna rubricaulis*, *Canna sanctae-rosae*, *Canna sanguinea*, *Canna saturate-rubra*, *Canna schubertii*, *Canna seleriana*, *Canna sellowii*, *Canna spectabilis*, *Canna surinamensis*, *Canna tenuiflora*, *Canna texensis*, *Canna variegata*, *Canna variegatifolia*, *Canna ventricosa*, *Canna warszewiczii* var. *flameus*, *Canna xalapensis*, *Cannacorus indicus*, *Distemon brasiliensis*, *Xyphostylis lutea*

čeleď: Cannaceae

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Katalánsko, Louisiana, Mexiko, Pákistán, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Pochází ze střední Ameriky, Karibiku a Mexika. Dorůstá výšky 0,6 - 3 (i 5)m. Pod zemí vytváří hlíznatý oddenek. Listy mají vejčitý tvar se špičkou, barvu zelenou až hnědočervenozelenou, délku 15 - 35 (i 60)cm a šířku 8 - 25cm. Kvete ve vzpřímených 6 - 20tikvětých hroznech na konci stonku v až 15cm červených listenech s průměrem 4 - 8cm v odstínech žluté, oranžové nebo červené, kališní lístky jsou zelené, dlouhé 1,4 - 1,5cm, koruna je kopinatá, delší kališních lístků a žlutozelená. Plody jsou 3četné, okrouhlé, dlouhé (1,2 -) 2 - 3 (i 4)cm a široké (1 -) 1,5 - 2 (i 3)cm s jemnými ostny, 3mi chloupky a obsahují kulovitá černá až tmavěhnědá semena průměru 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alberich' - výška 1,5m, růžovočervený květ
- 'Assault' - červené květy i listy
- 'Dazzler' - červený květ, bronzové listy
- var. *flava*
- 'Lucifer' - výška 1m, červený květ se žlutým okrajem
- var. *maculata*
- 'Perkeo' - výška 1,5m, červený květ
- 'President' - červený květ
- 'Puck' - výška 1,5m, žlutý květ
- 'Salmon Pink' - růžový květ
- var. *sanctae-rosae*
- 'Verdi' - oranžové květy se žlutými skvrnami, červené listy
- var. *warszewiczii*

- 'Yellow King Hubert' - žluté květy

Potřebují pravidelné zalévání a přihnojování, teplo, plné slunce až polostín, minerální a propustnou půdu. Je vhodná i pro pěstování v kyblíku. Musí být ale dostatečně velký, aby nedocházelo k jeho překlápění. Po prvních mrazících kdy se zničí nadzemní část se, oddenky se vyryjí a skladují se v suché (pokud budou svrasklé, můžete susbtrát navlhčit) rašelině nebo písku při teplotě 5 - 15°C.

Množí se dělením hlíz nebo semeny. V případě semen se ale ztrácí na velikosti květu.

<https://www.rostliny.net/>