

Albizia lebeck

synonyma: *Acacia lebeck*, *Acacia macrophylla*, *Acacia speciosa*, *Albizia latifolia*, *A. var. leucoxylo*, *A. var. pubescens*, *A. var. rostrata*, *Albizia lebbek*, *Feuilleea lebeck*, *Inga borbonica*, *Inga leucoxylo*, *Mimosa lebeck*, *Mimosa lebbek*, *Mimosa sirissa*, *Mimosa speciosa*, *Pithecellobium splitgerberianum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Írán, JV Asie, Kalifornie, Kamerun, Pákistán, Portoriko, S Austrálie, Texas

Roste v Pákistánu, tropické Asii a Africe a Austrálii v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 8 - 12 (i 30)m při průměru kmene do 90cm. Borka je tmavěšedá a hladká. Větve bývají v mládí ochlupené. Listy jsou 2x zpeřené, dlouhé až 40cm, řapíky jsou dlouhé 2 - 10cm, tvoří je 1 - 4 (i 5) primárními páry délky (5 -) 6 - 15 (i 20)cm a lístky v 3 - 9 (i 14)ti párech na 1mm řapíčku, jsou vstřícné, asymetricky lichoběžníkové, eliptické až obvejčité, zakulacené až uťaté, dlouhé 1,5 - 6,5cm, široké 0,6 - 3,5cm a báze asymetricky klínovitá až uťatá nebo zkoseně srdčitá. Květenstvím je úžlabní 15 - 40tikvětý hrozen seskupený v chocholíku, má 3,5 - 10cm stopku, vlastní květy jsou 5tičetné, stopky dlouhé (2 -) 4 - 8mm, bílé, kalich je ochlupený, zvonkovitý, krátce zubatý, drobně ochlupený, dlouhý (2,5 -) 3 - 4 (i 5)mm, cípy 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,7 - 1mm, koruna je žlutozelená, nálevkovitá, dlouhá 0,5 - 1,1cm, laloky špičaté, vejčité, dlouhé 2,5 - 4mm a tyčinky jsou na bázi bílé, vrcholek světlezelený až žlutozelený a celkově jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Plodem je slámový až světlehnědý podlouhlý až čárkovitý lusk délky (12 -) 15 - 30 (i 35)cm, šířky 2,5 - 5 (i 6,5)cm a obsahuje 6 - 12 zploštělých bleděhnědých eliptických semen délky 0,7 - 1,15cm a šířky 7 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>