

Albizia procera

synonyma: *Acacia procera*, *Acacia procera* var. *elata*, *Acacia procera* var. *roxburghiana*, *A.* var. *elata*, *A.* var. *roxburghiana*, *Feuillea procera*, *Lignum murinum-majus*, *Mimosa coriaria*, *Mimosa elata*, *Mimosa procera*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Austrálie, Borneo, Filipíny, Florida, Jáva, Melanésie, Myanmar (Barma), Nová Guinea, Pákistán, Portoriko, Střední Indie, Sulawesi (Celebes), Tanimbar Islands, Tchaj-wan, Thajsko

Roste v Pákistánu, Indii, Indočíně, Thajsku, Číně, Tchaj-wanu, Austrálii, Filipínách, Sulawesi, Jávě, Molukách, Borneu, Nove Guineji a Myanmaru v podobě opadavého stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 3 - 30m při průměru kmene do 60cm. Palisty jsou čárkovité až nitkovité, opadavé a dlouhé 0,5mm. Listy jsou střídavé, zpeřené, vřeteno dlouhé 10 - 30 (i 45)cm, čepel tvoří 2 - 6 primárních párů délky 12 - 20cm, 5 - 11 sekundárních, vlastní lístky jsou tmavězelené, asymetricky vejčité až eliptické, nebo kosočtvercovité, zakulacené až prakticky uťaté, zpravidla vykrojené s hrotem, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,9 - 3,5cm, báze asymetrická, z části uťatá, z části klínovitá. Květenství tvoří stopkatá 12 - 30tikvětá klubíčka ve vrcholové nebo úžlabní řídce ochlupené latě délky do 30cm, vlastní květy jsou přisedlé, oboupohlavné, 5tičetné, kalich světlezelený, trubkovitý nebo úzce nálevkovitý, dlouhý 1,5 - 3mm, cípy 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,7 - 1,2mm, koruna nazelenalá, nálevkovitá, dlouhá 3 - 6,5mm, laloky eliptické, špičaté a dlouhé 2 - 2,5mm. Plodem je krátce stopkatý tmavěhnědý až červenohnědý kožovitý zploštělý úzce podlouhlý lusk délky 10 - 20 (i 25)cm, šířky 1,2 - 3cm a obsahuje zploštělá mírně obvejčitá semena délky 7 - 8,5mm a šířky 4,5 - 6,5mm.

<https://www.rostliny.net/>