

Stipa pennata (Kavyl Ivanův)

synonyma: *Aristida pennata* var. *rigida*, *Stipa anomala*, *Stipa appendiculata*, *Stipa austriaca*, *Stipa austroitalica* subsp. *appendiculata*, *Stipa austroitalica* var. *appendiculata*, *Stipa borysthenica*, *Stipa borysthenica* subsp. *germanica*, *Stipa borysthenica* var. *germanica*, *Stipa disjuncta*, *Stipa eriocaulis*, *Stipa eriocaulis* subsp. *austriaca*, *Stipa eriocaulis* subsp. *dvorakii*, *Stipa eriocaulis* subsp. *kiemii*, *Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila*, *Stipa eriocaulis* subsp. *lutetiana*, *Stipa gallica*, *Stipa graniticola*, *Stipa iberica* f. *laevis*, *Stipa iberica* var. *pygmaea*, *Stipa joannis*, *Stipa joannis* f. *okensis*, *Stipa joannis* subsp. *germanica*, *Stipa joannis* subsp. *penicillifera*, *Stipa joannis* subsp. *sabulosa*, *Stipa lejophylla*, *Stipa lithophila*, *Stipa mediterranea* subsp. *gallica*, *Stipa oligotricha*, *Stipa oligotricha* subsp. *kiemii*, S. f. *gallica*, S. f. *penicillifera*, S. f. *sabulosa*, S. subsp. *austriaca*, S. subsp. *dvorakii*, S. subsp. *eriocaulis*, S. subsp. *joannis*, S. subsp. *kiemii*, S. subsp. *lejophylla*, S. subsp. *lithophila*, S. subsp. *sabulosa*, S. var. *anomala*, S. var. *appendiculata*, S. var. *austriaca*, S. var. *gallica*, S. var. *joannis*, S. var. *okensis*, S. var. *rigida*, *Stipa pulcherrima* var. *austriaca*, *Stipa pulcherrima* var. *gallica*, *Stipa sabulosa*, *Stipa sabulosa* subsp. *germanica*, *Stipa tauricola*, *Stipa veneta*

čeleď: Poaceae

oblasti: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sibiř, Slovensko, Slovinsko, Střední Asie, Střední střeozemí, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Z Rusko

Roste ve střední a východní Evropě, Sibiři a střední Asii. Dorůstá výšky 30 - 70 (i 80)cm. Horní stébelné listy mají pochvu hladkou. Květenstvím je lata, plucha má nejdelší řadu chlupů min. 4mm pod osinou. Plodem je mírně ztlustlá obilka délky 1,5 - 1,7 (i 1,8)cm na zahnuté stopce. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *eriocaulis*
- subsp. *iberica*
- subsp. *kiemii*
- subsp. *oligotricha*
- subsp. *pennata* (Kavyl Ivanův pravý) - pochvy i čepele listů holé (na spodní straně listů občas řídce ochlupené); suché kamenité stráně, holiny
- subsp. *puberula* (Kavyl Ivanův pýřitý) - pochvy přizemních listů i čepele na horní straně hustě ochlupené; hadcové stepi

Potřebuje plné slunce. Je odolný na sucho a roste i v chudé půdě.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>