

Morus rubra (Morušovník červený)

čeleď: Moraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky v podobě stromu s kratším kmenem a široce kulovitou asymetrickou řidší korunou. Dorůstá výšky 10 - 20m. Borka je hnědá a šupinatá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zelené, variabilní, zpravidla vejčité až prakticky kulaté, obvykle bez laloků, hustě ostře pilovité, drsné, dlouhé 7 - 12 (i 36)cm, báze srdčitá až zakulacená, na dlouhých větvích mohou být 3 - 5tilaločné a podzimní barva je žlutá. Plodenství je tmavě růžovofialové, válcovité, dlouze stopkaté, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 1cm a nakyslé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Nana' - zakrslý pomalý růst; listy menší se 3 - 5ti laloky
- 'Plataneifolia'/'Macrophylla' - menší stromovitý habitus; listy lesklé, zelené, široké až 25cm, na mladých exemplářích srdčité

<https://www.rostliny.net/>