

Muscari botryoides (Modřenec širolistý)

čeleď: Asparagaceae

oblasti: Alabama, Alpy, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Francie, Illinois, Indiana, Itálie, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Severní Karolína, Slovensko, Tennessee, Texas, Ukrajina, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Evropě (u nás na jižní Moravě) jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 30)cm. Pod zemí vytváří cibuli se světlou šedohnědou slupkou a nejsou u ní dceřiné cibulky. Listy jsou polovzpřímené, tuhé, široce čárkovité, ploché, žlábkovité, k bázi se mírně zužují, jsou seskupené přízemní růžici, z každé cibule vyrůstají pouze 2 - 3 (i 4)ks a jsou široké pouze 0,3 - 1cm. Kvete 6tičetnými květy seskupenými do vrcholového 10 - 40 (i 60)tičetného kuželovitého, později válcovitého hroznu s délkou 2 - 6cm, barva může být modrá, bílá, růžová nebo žlutá a okraj bílý. Plodem je obvejčitá tobolka obsahující černá svrasklá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album' - výška 15cm; květy bílé
- subsp. botryoides
- 'Caeruleum' - květy modré
- 'Carneum' - květy narůžovělé
- subsp. longifolium
- 'Pallidum' - květy světlemodré

Vyhovuje mu jak přímé slunce, tak polostín v horských loukách, křovinách nebo světlejších lesích. Vyhovují ji středně úrodné půdy. Je mrazuvzdorná a nenáročná na pěstování.

Množí se cibulemi.

<https://www.rostliny.net/>