

Pachypodium lamerei

synonyma: Pachypodium champenoisianum, P. var. lamerei, P. var. ramosum, Pachypodium ramosum, Pachypodium rutenbergianum f. lamerei, Pachypodium rutenbergianum var. lamerei

čeleď: Apocynaceae

oblasti: J Madagaskar, JZ Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě keře s vidličnatě větvenou korunou. Dorůstá výšky až 6 (i 8)m při tloušťce doutníkově tvarovaného kmenu až 60cm. Povrch je tmavězelený s šedostříbrným potahem, hrbolky s trny (délky do 2,5cm) ve spirále. Listy jsou tmavězelené, lesklé, podvinuté, dlouhé 25 - 35cm a široké 2,5 - 11cm. Květenstvím je okolík, vlastní květy jsou bílé, objevují se poprvé při výšce zhruba 1,5m (následuje rozdvojení stonku), mají délku 3 - 6cm, průměr 6 - 11cm a stopku délky 5 - 20cm. Plodem je 2pouzdrý měchýřek délky až 20cm a obsahuje hnědá válečkovitá semena délky 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lamerei

- var. ramosum - matnější a širší listy; květy bílé; polostín, teplota 35°C, při zimování sucho

Ročně může narůstat až o 20cm. Minimální teplota by měla být 12°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>