

Opuntia stricta

synonyma: *Cactus opuntia* var. *inermis*, *Cactus strictus*, *Cephalocereus strictus*, *Cereus mollis*, *Cereus nigricans*, *Cereus strictus*, *Consolea bahamana*, *Opuntia anahuacensis*, *Opuntia bentonii*, *Opuntia inermis*, *Opuntia macrantha*, *Opuntia magnifica*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Alabama, Austrálie, Florida, Georgia, J Afrika, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Karibik, Katalánsko, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Pákistán, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA, Mexiku, střední i Jižní Americe v podobě rozkladitého až vzpřímeného od báze větveného keře, zavlečená byla do Austrálie a jižní Afriky. Dorůstá výšky 0,8 - 1,5 (i 2)m. Články jsou zelené, zploštělé, eliptické až obvejčité nebo podlouhlé, hrbolaté, zelené až namodralé, dlouhé (7 -) 10 - 25 (i 40)cm, široké 7 - 20 (i 25)cm, areoly jsou hnědožlutě ochlupené, dlouhé 0,3 - 0,9 (i 1,2)cm, široké 3,5mm a obsahují až 11 žlutých, později hnědých přímých nebo zahnutých trnů délky 1,2 - 6cm. Listy jsou dlouhé 3 - 4 (i 6)mm. Květy mají průměr (5 -) 6 - 7cm, vnitřní korunní lístky jsou světle žluté a dlouhé 2,5 - 3cm. Plody jsou narůžovofialovělé, eliptické až soudkovité, dlouhé 4 - 6cm, široké 2,5 - 4cm, mají 6 - 10 areol a obsahují hnědožlutá semena délky 4 - 5mm a šířky 4 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dillenii*/O. *dillenii*/*Cactus dillenii* - horní články obvejčité, dlouhé 10 - 35cm, široké 12 - 20cm; areoly obsahují 1 - 11 trnů
- var. *stricta*/O. *bentonii*/O. *inermis*/*Cactus opuntia* var. *inermis* - horní články eliptické až obvejčité, dlouhé 12 - 25cm, široké 7 - 13cm; areoly max. s 1 trnem

<https://www.rostliny.net/>