

# Pachypodium namaquanum

synonyma: Adenium namaquanum

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Pochází z hranic Namibie a JAR. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5 (i 4)m a šířky 10 - 30cm. Kmen bývá nevětvený, válcovitý, při bázi nejširší, na povrchu má ve spirále bradavičnaté trnité hrbolky s trny délky 4 - 7 (i 8)cm. Palisty jsou dlouhé 3 - 7cm. Listy jsou umístěné na vrcholcích, jsou obvejčitě podlouhlé, zúžené a zaoblené, šedě zelené, z obou stran hustě sametové, zvlněné, dlouhé 8 - 12cm, široké 2 - 4 (i 6)cm, báze sbíhavá, řapíky nejsou patrné. Květenství je chudé, vlastní květy trubkovité, pohárkovité, uvnitř červené, na vnější straně zelené, dlouhé (2,5 -) 3 - 5cm s krátkými cípy. Plodem je párovitý při bázi spojený válcovitý krátce jemně šedě ochlupený měchýřek o délce až 4cm a obsahuje 50 - 70 vejčitých semen délky 4mm s chomáčkem bělavých chloupků.

Je náročný na pěstování, proto se používá roubování na *P. lamerei* nebo *P. geayi*. Důležité je hnojení. Zimujeme při teplotě kolem 15°C (minimální teplota by měla být 0°C.)

Množí se semeny, která musí být čerstvá. Velmi brzy ztrácí na klíčivosti.

<https://www.rostliny.net/>