

Mangifera caesia (Mangovník sivý)

synonyma: *Manga foetida*, *M. var. kemanga*, *M. var. verticillata*, *M. var. wanji*, *Mangifera foetida*, *Mangifera kemanga*, *Mangifera polycarpa*, *Mangifera verticillata*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Borneu, Sumatře a Malajském poloostrově v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30 (i 35)m při průměru kmene 0,75 - 1,55m (může být i ztlustlý). Borka je šedě hnědá a brázditá. Listy jsou kožovité, eliptické, vejčité nebo kopinaté, dlouhé 9 - 42cm, široké 3 - 12cm, báze klínovitá, konec krátce špičatý nebo tupý, žilnatinu tvoří 14 - 33 párů žilek mírně vystouplých z obou stran a řapíky jsou zploštělé, dlouhé 1,5 - 6cm. Kvete v terminálních pyramidálních drobně ochlupených laticích o délce 15 - 75cm, postranní větve jsou dlouhé do 15cm, květy jsou husté, listeny vejčité, dlouhé 2mm, stopky 1mm, korunních lístků 5, jsou fialové, úzce eliptické až úzce obkopinaté, dlouhé 5 - 8mm, široké 1 - 1,3mm, kalich 5tilaločný, laloky vejčité, kopinaté nebo eliptické, dlouhé 1,5 - 3mm, na vnější straně ochlupené. Plodem je jedlá eliptická nebo hruškovitá peckovice s hnědým, hnědožlutým nebo zelenobílým povrchem, žlutobílou dužinou, délkou 12 - 19cm a šířkou 6 - 10cm.

Vyhovují mu písčité půdy, teplo a vlhký vzduch.

<https://www.rostliny.net/>