

Mangifera foetida (Mango zápašné)

synonyma: *Manga foetida*, *Manga indica*, *M. var. leschenaultii*, *M. var. sphaeroidea*, *Mangifera horsfieldii*, *Mangifera indica*, *Mangifera leschenaultii*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Borneo, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko, Vietnam

Pochází z Malajského poloostrova a Indonésie. Patří mezi stálezelené stromy. Dorůstá výšky 10 - 40m při průměru kmene 0,3 - 1m. Borka je zelená nebo červenohnědá, drsná, brázditá nebo šupinatá. Listy jsou střídavé, tuhé, kožovité, dlouhé 14 - 35 (i 48)cm, široké 6 - 16 (i 19)cm, báze klínovitá, konec zaoblený (i mělce vykrojený nebo špičatý), žilnatinu tvoří 15 - 33 párů žilek vyniklých zejména na spodní straně a řapíky jsou dlouhé 2 - 8 (i 12)cm. Květenstvím je terminální, někdy i úžlabní pyramidální holá lata délky 10 - 40cm, postranní větve jsou dlouhé až 20cm, hustokvěté, listeny vejčitékopinaté, dlouhé 4 - 5mm, stopky květů dlouhé 1mm, korunní lístky narůžovělé až tmavěčervené, úzce kopinaté, dlouhé 6 - 9mm, široké 1,5 - 2,5mm, vonné, kalich 5tilaločný, laloky vejčité, dlouhé 3 - 5mm, bývají holé. Plodem je nažloutlá nebo šedozeleňá zkoseně vejčitá peckovice délky 8 - 18cm, šířky 6 - 12cm vydávající terpentýnové aroma. Slupka může být tlustá do 5mm, barvy hnědozelené s hnědými skvrnami, dužina je žlutá a šťavnatá. Uprostřed je jediná bílá pecka.

Vyhovují mu vlhké deštné lesy.

<https://www.rostliny.net/>