

Mangifera griffithii

synonyma: *Mangifera beccarii*, *Mangifera microphylla*, *Mangifera sclerophylla*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu a Malajském poloostrově v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene 1m. Listy jsou kožovité, eliptické až obvejčitě podlouhlé, dlouhé 5 - 23cm, široké 3 - 9cm, báze klínovitá nebo tupá, konec špičatý (i tupý), žilnatinu tvoří 6 - 16 párů oboustranně vystouplých žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 6cm. Kvete v terminální nebo úžlabní drobně ochlupené řídké latě o délce 10 - 24cm, listeny jsou vejčité, velké 2mm, stopky velké 0,5mm, korunní lístky bývají 4, kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 0,6 - 1,3mm, kalich bývá 4laločný, laloky široce vejčité, velké 1,5 - 2mm, drobně ochlupené a semeníky jsou téměř kulovité o průměru 1,5mm. Plodem je široce eliptická až obvejčitá, žlutá, růžovočervená až načernalá peckovice délky 2,5 - 3,5cm, šířky 1,5 - 2,5cm, má světlou oranžovožlutou šťavnatou a vláknitou dužinu.

<https://www.rostliny.net/>