

Mangifera quadrifida

synonyma: *Mangifera langong*, *Mangifera longipetiolata*, *Mangifera maingayi*, *M. var. spathulaefolia*, *Mangifera rigida*, *Mangifera spathulaefolia*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 35m při průměru kmene 25 - 90cm. Borka je bleděhnědá, hladká nebo mírně šupinatá. Listy jsou kožovité, eliptické až obkopinaté, dlouhé 6 - 30cm, široké 3 - 9cm, báze zaoblená nebo klínovitá, konec špičatý nebo tupý, žilnatinu tvoří 7 - 22 párů žilek vystouplých na spodní straně a řapíky jsou dlouhé 1 - 7cm. Kvete v terminální nebo i úžlabní pyramidální řídké holé latě o délce do 25cm, postranní větve jsou dlouhé do 15cm, listeny vejčité, dlouhé 3mm, stopky květů dlouhé 0,5 - 1,5mm, kalich 4laločný, laloky vejčité, dlouhé 2 - 3,5mm, holé, korunní lístky 4 bílé nebo nazelenalé, vejčité podlouhlé až eliptické, dlouhé 3,5 - 4,5mm, široké 1,5 - 2,5mm. Plodem je tmavá růžovofialová široce eliptická peckovice délky 8 - 10cm, šířky 5,5 - 7cm s vláknitou dužinou.

<https://www.rostliny.net/>