

## Euonymus americanus (Brslen americký)

synonyma: *Euonymus alternifolius*, *E. var. angustifolius*, *E. var. obovatus*, *E. var. sarmentosus*, *Euonymus angustifolius*, *Euonymus heterophyllus*, *Euonymus muricatus*, *Euonymus obovatus*, *Euonymus sarmentosus*, *Euonymus scandens*, *Euonymus sempervirens*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě opadavého vzpřímeného nebo vystoupavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5m. Větve jsou 4hranné, v mládí šedé a pupeny jsou dlouhé do 1,5cm. Listy jsou podlouhlé, kopinaté nebo úzce vejčité, vroubkovaně pilovité, mírně kožovité, tmavězelené, dlouhé 3 - 8 (i 10)cm a na podzim se barví do žlutooranžové. Květenství je chudé, vlastní květy vyrůstají po 1 - 3ks na 1 - 2cm stopce a v průměru mají 8mm. Plody jsou růžové, 3 - 5tipouzdré, ostnitě bradavičnaté s červeným míškem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- *var. angustifolius/E. angustifolius* - Georgia; vzpřímený habitus; mírně vyšší; listy užší, kopinaté, mírně zahnuté, na bázi zúžené, zelené, na podzim tmavě růžovofialové

<https://www.rostliny.net/>