

Euonymus atropurpureus (Brslen tmavočervený)

synonyma: *Euonymus atropurpureus*, *E. var. cheatumii*, *E. var. cheatumis*, *E. var. grandifolius*, *E. var. latifolius*, *E. var. oblongifolius*, *Euonymus caroliniensis*, *Euonymus latifolius*, *Euonymus tristis*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA v podobě opadavého vzpřímeného až vystoupavého keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 3 (i 8)m. Větve jsou 4hranné. Listy jsou eliptické až obvejčité (i mírně vejčité), drobně pilovité, dlouhé 4 - 12cm, spodní strana ochlupená a na podzim se mění do žluté až červenohnědé. Květy vyrůstají po 7 - 15ti ks na 2 - 4,5cm stopce, jsou růžovofialové a průměru 0,8 - 1cm. Plody jsou světle růžovofialové, 4pouzdré, široké 1,5cm a obsahují bílé až nahnědlé semeno s červeným míškem.

<https://www.rostliny.net/>