

Euonymus latifolius (Brslen širolistý)

synonyma: *Euonymus armasica*, *Euonymus europaeus* var. *latifolius*, *Euonymus ketzkhovellii*, E. f. *sempervirens*, E. var. *eximius*, E. var. *grandifolius*, E. var. *parvifolius*, *Euonymus leiophloeus*, *Euonymus leiophloeus* var. *armasicus*, *Euonymus leiophloeus* var. *sempervirens*, *Euonymus sempervirens*, *Kalonymus leiophloea*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Andalusie, Gruzie, Írán, Itálie, JV Evropa, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Německo, Švýcarsko, Ukrajina

Roste lesích a křovinách jižní a jihovýchodní Evropy, Turecka, Kavkazu a Íránu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 5 (i 6)m a šířky až 8m. Borka je šedá, hladká, max. mírně korkovitá a na vrcholcích má 0,5 - 1,5cm dlouhé podlouhlé pupeny. Větve jsou v mládí sivozelené s nahnědlými bradavičkami. Listy jsou vstřícné, eliptické až obvejčité, špičaté, drobně vroubkovaně pilovité, tmavězelené, (na podzim žlutozelené, okraj narůžovělý), lesklé, dlouhé (4 -) 6 - 12 (i 21)cm, široké (1,5 -) 4 - 7 (i 8)cm, báze klínovitá (i zakulacená), spodní strana světlezelená, řapíky na horní straně žlábkovité a dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je 7 - 15 (i 21)tičetný vidlan, vlastní květy jsou žlutozelené až zelenobílé, vně mírně načervenalé, široké 1cm, zpravidla 5tičetné, mají 4 - 6cm stopku, kalich je 4 - 5tičetný, laloky jsou obvejčité až prakticky kulaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou podlouhlé, zakulacené, dlouhé 2,5 - 3,5mm a široké 2 - 3mm. Plodem je růžovočervená křídlatá lesklá tobolka délky 0,7 - 1cm a šířky (1,5 -) 2 (i 3)cm s bílým semenem délky 7mm a oranžovým míškem. Je jedovatý.

Vyhovuje mu lehčí vlhká půda bohatá na živiny a vyšší vzdušná vlhkost a dobře snáší stín. U nás je mrazuvzdorný.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>