

Euonymus nanus (Brslen nízký)

synonyma: *Cneorum tricocon*, *Euonymus caucasicus*, *Euonymus koopmannii*, *Euonymus linifolius*, *E. var. turkestanicus*, *Euonymus rosmarinifolius*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Andalusie, Čína, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Kavkaz, Nový Brunšvik, Turkestán

Roste od západního středozeší přes Kavkaz a Turkestán do Číny v podobě opadavého, poléhavého až plazivého nebo i vystoupavého od báze větveného keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1 (i 2)m. Větve jsou v mládí hranaté a metlovité, zpravidla znovu kořenující. Listy jsou střídavé nebo v 3četných přeslenech, čárkovité, řídce pilovité, tupé nebo špičaté, podvinuté, tmavězelené, na podzim červené, dlouhé (1 -) 1,5 - 6 (i 7)cm, široké (3 -) 0,5 - 0,9 (i 2)cm, klínovité až prakticky zakulacené a řapíky jsou dlouhé 5mm. Květenství je 1 - 3 (i 4)četné, vlastní květy jsou zelenobílé, nahnědlé nebo hnědorůžovofialové, 3 - 4četné, široké 6mm, kališní lístky jsou drobné, korunní lístky jsou prakticky kulaté, 3hranné, červenohnědé, později černé a dlouhé 5mm. Plodem je růžová až červená tobolka obsahující hnědé semeno s červeným nebo oranžovým míškem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Turkestanicus'/var. *turkestanicus*/var. *koopmannii* - vzpřímenější až vystoupavý habitus; výška mírně přes 1m; listy nejsou podvinuté, dlouhé 4 - 7cm a široké 0,5 - 1cm

Vyhovuje mu mírné sušší prostředí na plném slunci s vápencovým dobře propustným základem.

Množí se semeny nebo řízký.

<https://www.rostliny.net/>