

Euonymus verrucosus (Brslen bradavičnatý)

synonyma: *Euonymus europaeus* var. *leprosus*, *Euonymus integerrimus*, *Euonymus oligospermus*, *Euonymus panonicus*, *Euonymus pauciflorus*, *Euonymus pauciflorus* subsp. *oligospermus*, *Euonymus pauciflorus* var. *chinensis*, *Euonymus verrucosa*, E. f. *angustifolius*, E. f. *cordatus*, E. f. *laevifolia*, E. f. *parvifolius*, E. var. *angustifolius*, E. var. *chinensis*, E. var. *pauciflorus*, E. var. *tchefouensis*, *Euonymus voitii*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Polsko, Ukrajina

Roste v jižní Evropě, Kavkaze a Malé Asii v podobě opadavého vzpřímeného nebo vystoupavého keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 3 (i 5)m. Starší větve mají hnědou barvu, červenohnědý bradavičnatý povrch, nevytvářejí korkové lišty a pupeny jsou dlouhé 3 - 4mm. Listy jsou vstřícné, eliptické až úzce obvejčité, zašpičatělé, vroubkovaně pilovité, tmavězelené, dlouhé 2 - 6 (i 8)cm, báze klínovitá, spodní strana je světlejší, na žilkách ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek, řapíky jsou žlábkovité, dlouhé 0,5 - 1cm a na podzim se barví do růžové až červené. Květenstvím je (1 -) 3 - 7mikvětý vidlan průměru 6mm, má 2 - 4cm stopku, vlastní květy jsou 4četné, nahnědlé, narůžovělé až tmavěčervené, aromatické, vlastní květy jsou 4četné, průměru 6mm, mají 0,5 - 3cm stopku a korunní lístky jsou hnědooranžové s červenými tečkami. Plodem je hluboce 4laločná žlutohnědá až červenohnědá tobolka šířky 6mm a obsahuje vejčité tmavěhnědé až černé jedovaté semeno s červeným nebo oranžovým míškem.

Vyhovují mu světlé lesy, doubravy, křoviny, stráně na plném slunci, atp. ve vápenité až neutrální půdě, na plném slunci, ale snáší i stín.

Množí se odkopky a semeny.

<https://www.rostliny.net/>