

## Rubus corchorifolius (Ostružiník zákulovitý)

synonyma: *Rubus althaeoides*, *Rubus arisanensis*, *Rubus arisanensis* var. *horishaensis*, *R. f. glaber*, *R. f. roseolus*, *R. var. glaber*, *R. var. oliveri*, *R. var. villosus*, *Rubus involucratus*, *Rubus kerrifolius*, *Rubus kerriifolius*, *Rubus oliveri*, *Rubus otophorus*, *Rubus shinkoensis*, *Rubus suishaensis*, *Rubus suishanensis*, *Rubus vaniotii*, *Rubus villosus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Čína, Japonsko, Korea, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Koreji a Vietnamu v podobě 1/2plazivého, vystoupavého nebo i vzpřímeného výběžkatého keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve má propletené, asymetricky obloukovité, dlouhé, ostnitě a v mládí až plstnaté. Listy jsou vejčitékopinaté až eliptické,, na sterilních větvích hluboce 3laločné, asymetricky pilovité, dlouhé 5 - 16cm, řapíky jsou ostnitě a dlouhé 1 - 2cm. Kvete po 1 až několika ks, vlastní květy jsou široké 1,5 - 3cm, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 8mm, široké 2 - 4mm, korunní lístky jsou podlouhlé nebo eliptické, dlouhé 0,8 - 1,2cm a široké 6 - 8mm. Plodenství je bleděčervené, prakticky kulaté nebo mírně vejčité a průměru 1 - 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *oliveri*/*R. oliveri* - Čína, Japonsko; listy ochlupené pouze na spodní straně na žilkách

<https://www.rostliny.net/>