

Rubus buergeri (Ostružiník Buergerův)

synonyma: *Rubus bodinieri*, *R. var. pseudobuergeri*, *Rubus calycinus var. pectinelloides*, *Rubus calycinus var. transiens*, *Rubus maximowiczii*, *Rubus moluccanus*, *Rubus moluccanus var. buergeri*, *Rubus pectinelloides*, *Rubus pectinellus*, *Rubus pseudobuergeri*, *Rubus rugosus*, *Rubus shimadae*, *Rubus shimadai*, *Rubus transiens*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Japonsko, JV Čína, Korea, Tchaj-wan

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Koreji a Japonsku v podobě mírně plazivého až mírně vystoupavého keře. Dorůstá výšky do 80cm. Stonky jsou propletené a asymetricky obloukovité. Palisty jsou opadavé a dlouhé 0,7 - 1cm. Listy jsou střídavé, jednoduché, vejčité až prakticky kulaté, 5 - 7milalčné, zpravidla tupé, průměru 5 - 11cm, báze je srdčitá, laloky jsou asymetricky ostře pilovité a řapíky jsou dlouhé 4 - 9cm. Květenství je vrcholové nebo úžlabní, dlouhé 4 - 6cm, listeny jsou dlouhé 7 - 9mm, vlastní květy mají 5 - 9mm stopku, průměr 0,6 - 1cm, kališní lístky jsou kopinaté nebo vejčitékopinaté, dlouhé 5 - 9mm, široké 3 - 5mm, korunní lístky jsou bílé a obvejčité. Plody jsou růžovofialovočerná, prakticky kulaté a průměru 0,6 - 2,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - listy mírně svrasklé, stříbřitě a bíle kropenaté

<https://www.rostliny.net/>