

Rubus enslenii

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland a Labrador, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe. Kmínky jsou slabé, rozkladité, vystoupavé nebo i vzpřímené, řídce ostnité a dlouhé 0,3 - 1,5m. Palisty jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,7 - 1cm. Listy jsou 3četné, řapíky max. s řídkými slabými ostny, dlouhé 3 - 6cm, vlastní lístky jsou slabé, kopinaté, oboustranně špičaté, zelené, na okraji ochlupené, 2x pilovité, dlouhé 3 - 6cm, v mládí mohou být na žilkách ochlupené, centrální má řapíček délky 1 - 1,8cm, postranní jsou max. krátce řapíčkaté, na fertilních větvích jsou 3četné, horní prakticky jednoduché, vlastní lístky jsou menší a širší, občas tupé a prakticky přisedlé. Kvete zpravidla samostatnými květy na vrcholcích větví, mají 3 - 6cm stopku, kališní lístky vejčité nebo kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 5 - 7mm, korunní lístky jsou mírně obvejčité, bílé a dlouhé 1,2 - 1,8cm. Plodenství je 1/2kulaté a černé.

<https://www.rostliny.net/>